

アトルバスタチン錠「Me」を 服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)

副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

アトルバスタチン錠「Me」を 服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)

副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

アトルバスタチン錠「Me」を 服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)

副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

アトルバスタチン錠「Me」を 服用されている方へ

血液中のコレステロールを減らすお薬です。



5mg (10錠シート)



10mg (10錠シート)

このお薬を飲むときの注意点

このお薬は、ごくまれに筋肉の副作用である「**横紋筋融解症**」が起こることがあります。次のような症状がみられたら、すぐに服用を中止して医師または薬剤師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

- ❗ 筋肉が痛い
- ❗ 手足に力が入らない
- ❗ 尿の色が濃い(赤褐色になる)

副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。



裏面の注意事項も必ずお読みください。▶▶▶

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなることがありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色^{せき かつしよく}の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気）になることもあります。



製造販売元
Meファルマ株式会社

販売元
株式会社フェルゼンファーマ

ATEF000202 ©
Me(GT)
改訂:2025.2

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなることがありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色^{せき かつしよく}の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気）になることもあります。



製造販売元
Meファルマ株式会社

販売元
株式会社フェルゼンファーマ

ATEF000202 ©
Me(GT)
改訂:2025.2

+

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなることがありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色^{せき かつしよく}の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気）になることもあります。



製造販売元
Meファルマ株式会社

販売元
株式会社フェルゼンファーマ

ATEF000202 ©
Me(GT)
改訂:2025.2

その他の注意事項

- 指示された食事療法や運動療法を必ず守ってください。
- グレープフルーツジュースによって、このお薬の作用が強くなることがありますので、一緒に飲むことは避けてください。
- 飲み忘れた場合は、気が付いた時、寝る前までにできるだけ早く1回分を飲んでください。
絶対に2回分を一度に飲んではいけません。
- 間違えて多く飲んだ場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
- 他のお薬（抗生剤など）を飲まれるときは、医師にご相談ください。また、体調に変化を感じたときは、必ず医師にご相談ください。

おうもんきんゆうかいしょう

横紋筋融解症とは

筋肉が障害され、筋肉の成分（ミオグロビン）が血液中に流れ出る病気です。筋肉痛や脱力などの症状があらわれます。赤褐色^{せき かつしよく}の尿が見られることがあり、放っておくと腎不全（腎臓の機能が低下し尿が出にくくなる病気）になることもあります。



製造販売元
Meファルマ株式会社

販売元
株式会社フェルゼンファーマ

ATEF000202 ©
Me(GT)
改訂:2025.2