


エゼチミブ錠 10mg「フェルゼン」 を服用される患者様へ

薬効成分の「エゼチミブ」には、小腸でのコレステロール吸収を抑えることによって、血液中のコレステロール値を下げる作用があります。

※本剤の効能：
「高コレステロール血症」
「家族性高コレステロール血症」



次の方は、主治医または薬剤師にお伝えください。

- ・くすりでアレルギー（発疹、かゆみなど）を経験したことがある。
- ・肝臓、胆のう、腎臓、甲状腺、筋肉に関わる病気にかかっている。
- ・妊娠している〔可能性がある〕、授乳中である。
- ・別のくすり、サプリメントを服用している。

● 服用に際して ●



- ・主治医・薬剤師の指示どおりに服用し、継続してください。自己判断による中止、服用量の変更などは、病状を悪化させる可能性があります。
- ・のみ忘れた場合、気づいた時に1回分を服用してください。次の服用時刻が近い場合は、忘れた分をとばして次の1回分のみを服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。
- ・誤って多くのんでしまった場合には、主治医・薬剤師にご相談ください。

エゼチミブ錠 10mg「フェルゼン」 を服用される患者様へ

薬効成分の「エゼチミブ」には、小腸でのコレステロール吸収を抑えることによって、血液中のコレステロール値を下げる作用があります。

※本剤の効能：
「高コレステロール血症」
「家族性高コレステロール血症」



次の方は、主治医または薬剤師にお伝えください。

- ・くすりでアレルギー（発疹、かゆみなど）を経験したことがある。
- ・肝臓、胆のう、腎臓、甲状腺、筋肉に関わる病気にかかっている。
- ・妊娠している〔可能性がある〕、授乳中である。
- ・別のくすり、サプリメントを服用している。


● 服用に際して ●



- ・主治医・薬剤師の指示どおりに服用し、継続してください。自己判断による中止、服用量の変更などは、病状を悪化させる可能性があります。
- ・のみ忘れた場合、気づいた時に1回分を服用してください。次の服用時刻が近い場合は、忘れた分をとばして次の1回分のみを服用してください。決して一度に2回分を服用しないでください。
- ・誤って多くのんでしまった場合には、主治医・薬剤師にご相談ください。

● 服用開始後の注意点 ●

- どの医薬品にも副作用の可能性はあります。ただ、その兆候をより早く発見して適切に対処すれば大事に至ることはほとんどありません。
- 服用中に以下の症状がみられた場合は、すみやかに 主治医 または 薬剤師に相談してください。（横紋筋融解症^{おうちんきんゆうかいししょう}* という副作用の可能性ががあります）



※横紋筋融解症：

筋肉の細胞が壊れて死んでしまうことで 筋肉の痛み・しびれ・脱力などを生じますが、発見が早いほど予後（回復などの見通し）は良いとされます。しかし、そのまま放置しておく、重い腎障害へと進展したり、代謝障害、多臓器不全といった生命の危機に陥る可能性もあります。（早期発見 → すぐ相談が大切！）

- その他、食欲不振、吐き気 等々、からだの様子で少しでも気になることがあれば、遠慮せず主治医、薬剤師にご相談しましょう。


● 保管上の注意点 ●

- お子様の手の届かない場所に、湿気や強い光（直射日光など）を避けて室温（1～30℃）で保管してください。

薬局名/病・医院名

● 服用開始後の注意点 ●

- どの医薬品にも副作用の可能性はあります。ただ、その兆候をより早く発見して適切に対処すれば大事に至ることはほとんどありません。
- 服用中に以下の症状がみられた場合は、すみやかに 主治医 または 薬剤師に相談してください。（横紋筋融解症^{おうちんきんゆうかいししょう}* という副作用の可能性ががあります）



※横紋筋融解症：

筋肉の細胞が壊れて死んでしまうことで 筋肉の痛み・しびれ・脱力などを生じますが、発見が早いほど予後（回復などの見通し）は良いとされます。しかし、そのまま放置しておく、重い腎障害へと進展したり、代謝障害、多臓器不全といった生命の危機に陥る可能性もあります。（早期発見 → すぐ相談が大切！）

- その他、食欲不振、吐き気 等々、からだの様子で少しでも気になることがあれば、遠慮せず主治医、薬剤師にご相談しましょう。

● 保管上の注意点 ●

- お子様の手の届かない場所に、湿気や強い光（直射日光など）を避けて室温（1～30℃）で保管してください。

薬局名/病・医院名