

クロピドグレル錠「フェルゼン」 を服用される方へ

本剤は…血のかたまり（血栓）により血管がつまるのを防ぐお薬です。

□ 25mg 錠



□ 75mg 錠



服用前のご確認

次の方は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- 薬によるアレルギー症状（かゆみ、発疹など）の経験がある
- 出血しやすい、手術や抜歯の予定がある ●肝臓、腎臓の病気がある
- 血圧が高い ●妊娠している〔可能性がある〕、授乳している
- 本剤以外の薬も服用している

服用にあたって

- 指示どおりにお飲みください（空腹時を避けコップ1杯程の水かぬるま湯で）。
- 飲み忘れに気づいたら すぐに服用してください（ただし、次の服用時刻まで近い場合は1回分をとばし、次回分のみ服用してください）。
決して1度に2回分を服用しないで下さい。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師・薬剤師の先生にご相談ください。

薬局名 / 病・医院名

クロピドグレル錠「フェルゼン」 を服用される方へ

本剤は…血のかたまり（血栓）により血管がつまるのを防ぐお薬です。

□ 25mg 錠



□ 75mg 錠



服用前のご確認

次の方は、必ず医師または薬剤師にご相談ください。

- 薬によるアレルギー症状（かゆみ、発疹など）の経験がある
- 出血しやすい、手術や抜歯の予定がある ●肝臓、腎臓の病気がある
- 血圧が高い ●妊娠している〔可能性がある〕、授乳している
- 本剤以外の薬も服用している

服用にあたって

- 指示どおりにお飲みください（空腹時を避けコップ1杯程の水かぬるま湯で）。
- 飲み忘れに気づいたら すぐに服用してください（ただし、次の服用時刻まで近い場合は1回分をとばし、次回分のみ服用してください）。
決して1度に2回分を服用しないで下さい。
- 誤って多く飲んだ場合は、すぐに医師・薬剤師の先生にご相談ください。

薬局名 / 病・医院名

服薬を始めてから

次の症状に気がつきましたら、直ちに医師・薬剤師に連絡してください。

出血しやすい 鼻血・歯ぐきの出血
皮膚にあおあざ、斑点ができる

尿が茶色っぽい・血が混じる
便が黒い、血が混じる

かゆみ 皮膚、白目が黄色い
皮膚、粘膜のぶつぶつ・水ぶくれ

うとうとする 意識がうすくなる
突如の頭痛 めまい

かぜのような症状
(熱、さむけ、のどの痛み)

疲れやすい だるい 筋肉が痛い
食欲不振 吐き気・嘔吐 腹痛

その他、少しでも気になる症状があれば、医師・薬剤師にご相談ください。

その他にも…

次の場合、この薬を服用していることを医師・薬剤師に必ずお伝えください。

- 他の病・医院（歯科も含む）や薬局を訪れる場合
：異なる薬を同時に服用することで、一方の薬の作用が強力になりすぎたり不十分になったり…など 色々な影響を受ける場合があります。
- 手術、外科的処置（抜歯など）、内視鏡検査などを受ける場合
：出血があった際、血が止まりにくくなる場合があります。

保管、取り扱い

- 高温、湿気、光（直射日光など）を避けてください。
- お子様や他の人が誤って服用しないよう、保管場所にご留意ください。
- この薬はご自身用ですので、他の人には絶対渡さないでください。
余った場合には、薬局や病・医院にご相談ください。

服薬を始めてから

次の症状に気がつきましたら、直ちに医師・薬剤師に連絡してください。

出血しやすい 鼻血・歯ぐきの出血
皮膚にあおあざ、斑点ができる

尿が茶色っぽい・血が混じる
便が黒い、血が混じる

かゆみ 皮膚、白目が黄色い
皮膚、粘膜のぶつぶつ・水ぶくれ

うとうとする 意識がうすくなる
突如の頭痛 めまい

かぜのような症状
(熱、さむけ、のどの痛み)

疲れやすい だるい 筋肉が痛い
食欲不振 吐き気・嘔吐 腹痛

その他、少しでも気になる症状があれば、医師・薬剤師にご相談ください。

その他にも…

次の場合、この薬を服用していることを医師・薬剤師に必ずお伝えください。

- 他の病・医院（歯科も含む）や薬局を訪れる場合
：異なる薬を同時に服用することで、一方の薬の作用が強力になりすぎたり不十分になったり…など 色々な影響を受ける場合があります。
- 手術、外科的処置（抜歯など）、内視鏡検査などを受ける場合
：出血があった際、血が止まりにくくなる場合があります。

保管、取り扱い

- 高温、湿気、光（直射日光など）を避けてください。
- お子様や他の人が誤って服用しないよう、保管場所にご留意ください。
- この薬はご自身用ですので、他の人には絶対渡さないでください。
余った場合には、薬局や病・医院にご相談ください。