

## 医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2018（2019年更新版）に準拠して作成

選択的セロトニン再取り込み阻害剤

セルトラリン塩酸塩錠

セルトラリン錠 25mg 「TCK」  
セルトラリン錠 50mg 「TCK」

SERTRALINE Tablets 「TCK」

剤形	フィルムコーティング錠
製剤の規制区分	劇薬、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）
規格・含量	錠 25mg：1錠中にセルトラリン塩酸塩を 28.0mg（セルトラリンとして 25mg）含有する。 錠 50mg：1錠中にセルトラリン塩酸塩を 56.0mg（セルトラリンとして 50mg）含有する。
一般名	和名：セルトラリン塩酸塩（JAN） 洋名：Sertraline Hydrochloride（JAN）
製造販売承認年月日	製造販売承認年月日：2015年8月17日
薬価基準収載 ・販売開始年月日	薬価基準収載年月日：2015年12月11日 販売開始年月日：2015年12月11日
製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元 辰巳化学株式会社 販売元 株式会社フェルゼンファーマ
医薬情報担当者の 連絡先	
問い合わせ窓口	辰巳化学株式会社 薬事・学術課 TEL:076-247-2132 FAX:076-247-5740 医療関係者向け情報 <a href="https://www.tatsumi-kagaku.com/public/info_medical/list.php">https://www.tatsumi-kagaku.com/public/info_medical/list.php</a>

本IFは2024年1月改訂（第2版）の添付文書の記載に基づき改訂した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

# 医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要－日本病院薬剤師会－

(2020年4月改訂)

## 1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、I Fと略す）が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第2小委員会がI Fの位置付け、I F記載様式、I F記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がI F記載要領の改訂を行ってきた。I F記載要領2008以降、I FはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したI Fが速やかに提供されることとなった。最新版のI Fは、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情報検索のページ（<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>）にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のI Fの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のI Fが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせて、I F記載要領2018が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

## 2. I Fとは

I Fは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

I Fに記載する項目配列は日病薬が策定したI F記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・

判断・提供すべき事項等は I F の記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供された I F は、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

I F の提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

### 3. I F の利用にあたって

電子媒体の I F は、PMD A の医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って I F を作成・提供するが、I F の原点を踏まえ、医療現場に不足している情報や I F 作成時に記載し難い情報等については製薬企業の MR 等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、I F の利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、I F が改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、I F の使用にあたっては、最新の添付文書を PMD A の医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V. 5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」、「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

### 4. 利用に際しての留意点

I F を日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。I F は日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には薬機法の広告規則や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR 等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らが I F の内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、I F を活用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

# 目次

I.	概要に関する項目	1	8.	トランスポーターに関する情報	24
1.	開発の経緯	1	9.	透析等による除去率	25
2.	製品の治療学的特性	1	10.	特定の背景を有する患者	25
3.	製品の製剤学的特性	1	11.	その他	25
4.	適正使用に関して周知すべき特性	1	VIII.	安全性（使用上の注意等）に関する項目	26
5.	承認条件及び流通・使用上の制限事項	1	1.	警告内容とその理由	26
6.	RMP の概要	1	2.	禁忌内容とその理由	26
II.	名称に関する項目	2	3.	効能又は効果に関連する注意とその理由	26
1.	販売名	2	4.	用法及び用量に関連する注意とその理由	26
2.	一般名	2	5.	重要な基本的注意とその理由	26
3.	構造式又は示性式	2	6.	特定の背景を有する患者に関する注意	27
4.	分子式及び分子量	2	7.	相互作用	29
5.	化学名（命名法）又は本質	2	8.	副作用	33
6.	慣用名、別名、略号、記号番号	2	9.	臨床検査結果に及ぼす影響	35
III.	有効成分に関する項目	3	10.	過量投与	36
1.	物理化学的性質	3	11.	適用上の注意	36
2.	有効成分の各種条件下における安定性	3	12.	その他の注意	36
3.	有効成分の確認試験法、定量法	3	IX.	非臨床試験に関する項目	38
IV.	製剤に関する項目	4	1.	薬理試験	38
1.	剤形	4	2.	毒性試験	38
2.	製剤の組成	4	X.	管理的事項に関する項目	39
3.	添付溶解液の組成及び容量	5	1.	規制区分	39
4.	力価	5	2.	有効期間	39
5.	混入する可能性のある夾雑物	5	3.	包装状態での貯法	39
6.	製剤の各種条件下における安定性	5	4.	取扱い上の注意	39
7.	調製法及び溶解後の安定性	8	5.	患者向け資材	39
8.	他剤との配合変化（物理化学的変化）	8	6.	同一成分・同効薬	39
9.	溶出性	9	7.	国際誕生年月日	39
10.	容器・包装	13	8.	製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準取載年月日、販売開始年月日	39
11.	別途提供される資材類	13	9.	効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容	40
12.	その他	13	10.	再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容	40
V.	治療に関する項目	14	11.	再審査期間	40
1.	効能又は効果	14	12.	投薬期間制限に関する情報	40
2.	効能又は効果に関連する注意	14	13.	各種コード	40
3.	用法及び用量	14	14.	保険給付上の注意	40
4.	用法及び用量に関連する注意	14	XI.	文献	41
5.	臨床成績	15	1.	引用文献	41
VI.	薬効薬理に関する項目	19	2.	その他の参考文献	42
1.	薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	19	XII.	参考資料	43
2.	薬理作用	19	1.	主な外国での発売状況	43
VII.	薬物動態に関する項目	20	2.	海外における臨床支援情報	43
1.	血中濃度の推移	20	XIII.	備考	44
2.	薬物速度論的パラメータ	23	1.	調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報	44
3.	母集団（ポピュレーション）解析	23	2.	その他の関連資料	46
4.	吸収	23			
5.	分布	23			
6.	代謝	24			
7.	排泄	24			

# I. 概要に関する項目

## 1. 開発の経緯

セルトラリン錠 25mg「TCK」／錠 50mg「TCK」は、辰巳化学株式会社が後発医薬品として開発を企画し、薬食発第 0331015 号（2005 年 3 月 31 日）に基づき、承認申請し、2015 年 8 月に承認を得て、2015 年 12 月発売に至った。

また、セルトラリン錠 25mg「TCK」／錠 50mg「TCK」は 2016 年 3 月に「外傷後ストレス障害」の効能又は効果の追加が承認された。

## 2. 製品の治療学的特性

本剤は、セルトラリン塩酸塩を有効成分とする選択的セロトニン再取り込み阻害剤である。主な副作用として傾眠、頭痛、悪心・嘔吐、口内乾燥、下痢・軟便がある。重大な副作用として、セロトニン症候群、悪性症候群、痙攣、昏睡、肝機能障害、抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、アナフィラキシー、QT 延長、心室頻拍（torsade de pointes を含む）、血小板減少があらわれることがある。（「VIII. 8. 副作用」の項参照）

## 3. 製品の製剤学的特性

特になし

## 4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、 最適使用推進ガイドライン等	有無
RMP	無
追加のリスク最小化活動として 作成されている資材	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

## 5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

### (1) 承認条件

該当しない

### (2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

## 6. RMP の概要

該当しない

## II. 名称に関する項目

### 1. 販売名


- (1) 和名：セルトラリン錠 25mg 「TCK」  
セルトラリン錠 50mg 「TCK」
- (2) 洋名：SERTRALINE Tablets 25mg 「TCK」  
SERTRALINE Tablets 50mg 「TCK」
- (3) 名称の由来  
含有する有効成分名＋剤形＋含量＋屋号

### 2. 一般名

- (1) 和名：セルトラリン塩酸塩 (JAN)
- (2) 洋名：Sertraline Hydrochloride (JAN)  
Sertraline (INN)
- (3) ステム：セロトニン再取り込み阻害薬：-traline

### 3. 構造式又は示性式

構造式：



### 4. 分子式及び分子量

分子式：C<sub>17</sub>H<sub>17</sub>Cl<sub>2</sub>N · HCl

分子量：342.69

### 5. 化学名（命名法）又は本質

(+)-(1*S*,4*S*)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-*N*-methyl-1-naphthylamine monohydrochloride  
(IUPAC)

### 6. 慣用名、別名、略号、記号番号

### III. 有効成分に関する項目

#### 1. 物理化学的性質

##### (1) 外観・性状

白色の結晶性の粉末である。

##### (2) 溶解性

メタノール、エタノール (95) 又は N,N-ジメチルアセトアミドにやや溶けやすく、エタノール (99.5) にやや溶けにくく、水に溶けにくい。

##### (3) 吸湿性

該当資料なし

##### (4) 融点 (分解点)、沸点、凝固点

該当資料なし

##### (5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

##### (6) 分配係数

該当資料なし

##### (7) その他の主な示性値

該当資料なし

#### 2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

#### 3. 有効成分の確認試験法、定量法

##### 確認試験法

- ・赤外吸収スペクトル測定法
- ・塩化物の定性反応 (2)

##### 定量法

液体クロマトグラフィー







## IV. 製剤に関する項目

### 1. 剤形

#### (1) 剤形の区別

錠剤（フィルムコーティング錠）

#### (2) 製剤の外観及び性状

販売名	外形			色調 剤形
	直径(mm)	厚さ(mm)	重量(mg)	
セルトラリン錠 25mg 「TCK」	 8.4×4.1	 3.1	 93	白色・楕円形 フィルム コーティング錠
セルトラリン錠 50mg 「TCK」	 7.1	 3.6	 155	白色 フィルム コーティング錠

#### (3) 識別コード

販売名	本体	包装材料
セルトラリン錠 25mg 「TCK」	TU 174	TU 174
セルトラリン錠 50mg 「TCK」	TU 175	TU 175

#### (4) 製剤の物性

該当資料なし

#### (5) その他

該当しない

### 2. 製剤の組成

#### (1) 有効成分（活性成分）の含量及び添加剤

販売名	有効成分（1錠中）	添加剤
セルトラリン錠 25mg 「TCK」	セルトラリン塩酸塩 28.0mg (セルトラリンとして 25mg)	結晶セルロース、リン酸水素カルシウム水和物、デンプングリコール酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール400、酸化チタン、ポリソルベート80、カルナウバロウ
セルトラリン錠 50mg 「TCK」	セルトラリン塩酸塩 56.0mg (セルトラリンとして 50mg)	



(2) 電解質等の濃度

該当しない

(3) 熱量

該当しない

3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

4. 力価

該当しない

5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

6. 製剤の各種条件下における安定性

試験項目及び規格

試験項目	規 格
性状	25mg：白色、楕円形のフィルムコーティング錠 50mg：白色、円形のフィルムコーティング錠
確認試験	薄層クロマトグラフィー 規格：試料溶液から得た主スポットは標準溶液から得られたスポットとRf値が等しい
製剤均一性 (含量均一性)	判定値は 15.0%を超えない
溶出性	25mg：30 分間の溶出率は 80%以上である (パドル法、pH4.5 の 0.05mol/L 酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液、75rpm) 50mg：45 分間の溶出率は 80%以上である (パドル法、pH4.5 の 0.05mol/L 酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液、75rpm)
定量	表示量の 95.0～105.0%を含む

<加速試験>

●セルトラリン錠 25mg 「TCK」<sup>1)</sup>

保管条件：40±2°C、75±5%RH

包装形態：PTP 包装（PTP+紙箱）

試験結果：

	開始時	1 カ月後	3 カ月後	6 カ月後
性状	白色、楕円形の フィルムコーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
確認試験	適合			適合
製剤均一性	適合			適合
溶出性	適合	適合	適合	適合
定量 (%)	99.6	101.0	100.4	100.5
	100.0	102.3	100.5	100.9
	100.3	102.4	101.8	101.5

1 ロット n=3 3 ロット

●セルトラリン錠 50mg 「TCK」<sup>2)</sup>

保管条件：40±2°C、75±5%RH

包装形態：PTP 包装（PTP+紙箱）

試験結果：

	開始時	1 カ月後	3 カ月後	6 カ月後
性状	白色、円形の フィルムコーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
確認試験	適合			適合
製剤均一性	適合			適合
溶出性	適合	適合	適合	適合
定量 (%)	100.1	101.2	100.0	102.1
	100.3	101.4	100.3	101.0
	100.7	102.5	100.7	101.5

1 ロット n=3 3 ロット

< 無包装下の安定性 >

平成 11 年 8 月 20 日付「錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について（答申）」  
（日本病院薬剤師会）を参考に、無包装状態の試験を行った。

●セルトラリン錠 25mg 「TCK」

保存条件		試験項目	規格	結果			
				開始時	1 箇月	2 箇月	3 箇月
温度	40±2°C 遮光 気密容器	性状	白色、楕円形の フィルム コーティング錠	白色、楕円形の フィルム コーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
		硬度*1 (kg)	2.0kg 以上 (参考)	7.9	7.9	7.7	7.8
		溶出性*2 (%)	30 分間、80%以上 (最小値～最大値)	97～100	100～101	99～101	99～100
		定量*3 (%)	95.0%～105.0%	99.9	100.0	100.2	100.3
湿度	25±2°C 75±5%RH 遮光 開放	性状	白色、楕円形の フィルム コーティング錠	白色、楕円形の フィルム コーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
		硬度*1 (kg)	2.0kg 以上 (参考)	7.9	5.3	5.6	6.6
		溶出性*2 (%)	30 分間、80%以上 (最小値～最大値)	97～100	100～101	99～100	99～100
		定量*3 (%)	95.0%～105.0%	99.9	100.4	99.9	100.4

保存条件		試験項目	規格	結果	
				開始時	60 万 lx・hr
光	温度 なりゆき 1000lx/hr 気密容器	性状	白色、楕円形の フィルム コーティング錠	白色、楕円形の フィルム コーティング錠	変化なし
		硬度*1 (kg)	2.0kg 以上 (参考)	7.9	7.2
		溶出性*2 (%)	30 分間、80%以上 (最小値～最大値)	97～100	99～101
		定量*3 (%)	95.0%～105.0%	99.9	99.3

\*1 n=10 の平均値

\*2 n=6

\*3 n=3 の平均値

●セルトラリン錠 50mg 「TCK」

保存条件		試験項目	規格	結果			
				開始時	1 箇月	2 箇月	3 箇月
温度	40±2°C 遮光 気密容器	性状	白色、円形の フィルム コーティング錠	白色、円形の フィルム コーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
		硬度*1 (kg)	2.0kg 以上 (参考)	7.4	7.3	6.7	7.6
		溶出性*2 (%)	45 分間、80%以上 (最小値～最大値)	98～102	100～101	99～100	99～100
		定量*3 (%)	95.0%～105.0%	99.2	99.5	100.2	101.3
湿度	25±2°C 75±5%RH 遮光 開放	性状	白色、円形の フィルム コーティング錠	白色、円形の フィルム コーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
		硬度*1 (kg)	2.0kg 以上 (参考)	7.4	4.9	4.8	5.7
		溶出性*2 (%)	45 分間、80%以上 (最小値～最大値)	98～102	100～101	98～100	99～100
		定量*3 (%)	95.0%～105.0%	99.2	99.5	100.2	100.8

保存条件		試験項目	規格	結果	
				開始時	60 万 lx・hr
光	温度 なりゆき 1000lx/hr 気密容器	性状	白色、円形の フィルム コーティング錠	白色、円形の フィルム コーティング錠	変化なし
		硬度*1 (kg)	2.0kg 以上 (参考)	7.4	6.2
		溶出性*2 (%)	45 分間、80%以上 (最小値～最大値)	98～102	99～101
		定量*3 (%)	95.0%～105.0%	99.2	99.8

\*1 n=10 の平均値

\*2 n=6

\*3 n=3 の平均値

7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

8. 他剤との配合変化（物理化学的变化）

該当資料なし

## 9. 溶出性

< 溶出挙動における類似性 >

### ●セルトラリン錠 25mg 「TCK」<sup>3)</sup>

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（薬食審査発 0229 第 10 号、2012 年 2 月 29 日）に従いセルトラリン錠 25mg 「TCK」（試験製剤）とジェイゾロフト錠 25mg（標準製剤）との溶出挙動の比較を行った結果、一部の溶出試験条件を除き同等性試験ガイドラインの溶出挙動の類似性の判定基準に適合した。

結果

#### ○pH 1.2（毎分 50 回転）

f2 関数の値は 48 であり、42 以上であった。

#### ○pH 5.0（毎分 50 回転）

f2 関数の値は 43 であり、42 以上であった。

#### ○pH 6.8（毎分 50 回転）

f2 関数の値は 68 であり、42 以上であった。

#### ○水（毎分 50 回転）

標準製剤の平均溶出率が 40% 及び 85% 付近となる適当な 2 時点（5 分及び 180 分）において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率 ± 15% の範囲にあった。


#### ○pH 6.8（毎分 100 回転）

f2 関数の値は 39 であり、42 以上になく、非類似であった。

溶出試験条件		判定時間 (分)	平均溶出率 (%)		平均溶出率の 差 (%)
			ジェイゾロフト錠 25mg	セルトラリン錠 25mg 「TCK」	
pH 1.2	50 回転/分	f2 関数の値は 48 で 42 以上			適合
pH 5.0	50 回転/分	f2 関数の値は 43 で 42 以上			適合
pH 6.8	50 回転/分	f2 関数の値は 68 で 42 以上			適合
水	50 回転/分	5	43.0	53.9	範囲内
		180	84.5	91.9	範囲内
pH 6.8	100 回転/分	f2 関数の値は 39 で 42 未満			不適合


(n=12)

pH 1.2 (毎分 50 回転)




(n=12)

pH 5.0 (毎分 50 回転)




(n=12)

pH 6.8 (毎分 50 回転)




(n=12)

水 (毎分 50 回転)





(n=12)

pH 6.8 (毎分 100 回転)



(n=12)

 判定基準の  
 適合範囲

●セルトラリン錠 50mg 「TCK」<sup>4)</sup>

後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（薬食審査発 0229 第 10 号、2012 年 2 月 29 日）に従いセルトラリン錠 50mg 「TCK」（試験製剤）とジェイゾロフト錠 50mg（標準製剤）との溶出挙動の比較を行った結果、全ての溶出試験条件において同等性試験ガイドラインの溶出挙動の類似性の判定基準に適合した。

結果

○pH 1.2（毎分 50 回転）

標準製剤の平均溶出率が 40%及び 85%付近となる適当な 2 時点（5 分及び 45 分）において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にあった。

○pH 5.0（毎分 50 回転）

f2 関数の値は 58 であり、42 以上であった。

○pH 6.8（毎分 50 回転）

f2 関数の値は 53 であり、46 以上であった。

○水（毎分 50 回転）

標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点（5 分）、及び規定された試験時間（360 分）において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±12%の範囲にあった。


○pH 5.0（毎分 100 回転）

f2 関数の値は 45 であり、42 以上であった。

溶出試験条件		判定時間 (分)	平均溶出率 (%)		平均溶出率の 差 (%)
			ジェイゾロフト錠 50mg	セルトラリン錠 50mg 「TCK」	
pH 1.2	50 回転/分	5	42.0	53.9	範囲内
		45	84.9	91.5	範囲内
pH 5.0	50 回転/分	f2 関数の値は 58 で 42 以上			適合
pH 6.8	50 回転/分	f2 関数の値は 53 で 46 以上			適合
水	50 回転/分	5	41.7	53.9	範囲内
		360	83.7	92.0	範囲内
pH 5.0	100 回転/分	f2 関数の値は 45 で 42 以上			適合


(n=12)

pH 1.2 (毎分 50 回転)




(n=12)

pH 5.0 (毎分 50 回転)




(n=12)

pH 6.8 (毎分 50 回転)




(n=12)

水 (毎分 50 回転)



(n=12)

pH 5.0 (毎分 100 回転)



(n=12)

○ 判定基準の  
適合範囲



## 10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当資料なし

(2) 包装

<セルトラリン錠 25mg 「TCK」 >

100 錠 (10 錠 (PTP) × 10)

<セルトラリン錠 50mg 「TCK」 >

100 錠 (10 錠 (PTP) × 10)

(3) 予備容量

該当しない

(4) 容器の材質

包装形態	材質
PTP 包装	ポリ塩化ビニルフィルム アルミニウム箔

## 11. 別途提供される資材類

無し

## 12. その他

該当資料なし

## V. 治療に関する項目

### 1. 効能又は効果

- うつ病・うつ状態
- パニック障害
- 外傷後ストレス障害

### 2. 効能又は効果に関連する注意

#### 5. 効能又は効果に関連する注意

〈効能共通〉

5.1 抗うつ剤の投与により、24歳以下の患者で、自殺念慮、自殺企図のリスクが増加するとの報告がある。本剤の投与にあたっては、リスクとベネフィットを考慮すること。

[8.1-8.4, 9.1.1, 9.1.2, 9.7.2, 9.7.3, 15.1.1 参照]

〈うつ病・うつ状態〉

5.2 本剤を18歳未満の大うつ病性障害患者に投与する際には適応を慎重に検討すること。

[9.7.2 参照]

〈外傷後ストレス障害〉

5.3 本剤を18歳未満の外傷後ストレス障害患者に投与する際には適応を慎重に検討すること。[9.7.3 参照]

5.4 外傷後ストレス障害の診断は、DSM<sup>注)</sup>等の適切な診断基準に基づき慎重に実施し、基準を満たす場合にのみ投与すること。

注) DSM: American Psychiatric Association (米国精神医学会) の Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (精神疾患の診断・統計マニュアル)

### 3. 用法及び用量

#### (1) 用法及び用量の解説

通常、成人にはセルトラリンとして1日25mgを初期用量とし、1日100mgまで漸増し、1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により1日100mgを超えない範囲で適宜増減する。

#### (2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

### 4. 用法及び用量に関連する注意

#### 7. 用法及び用量に関連する注意

本剤の投与量は、予測される効果を十分に考慮し、必要最小限となるよう、患者ごとに慎重に観察しながら調節すること。[8.1-8.4, 9.1.1, 9.1.2, 15.1.1 参照]

## 5. 臨床成績

### (1) 臨床データパッケージ

該当資料なし

### (2) 臨床薬理試験

該当資料なし

### (3) 用量反応探索試験

該当資料なし

### (4) 検証的試験

#### 1) 有効性及び安全性に関する試験

〈うつ病・うつ状態〉

##### ①国内第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験

前期第Ⅱ相試験（内科・心療内科）、前期第Ⅱ相試験（精神科）、後期第Ⅱ相試験、第Ⅲ相試験（内科・心療内科）、第Ⅲ相試験（精神科）、ランダム化治療中止試験、高齢者試験及び長期投与試験を総合（計 8 試験）した場合、セルトラリンの改善率は 55.7%（491/882 例）であった。初期用量で効果が認められない患者においても、増量することで効果が認められた。ただし、第Ⅲ相試験ではトラゾドン塩酸塩及びアミトリプチリン塩酸塩と比較する二つの二重盲検比較試験が行われたが、有効性について両薬剤と同等、あるいはそれ以上の効果を有することは検証されなかった。

有効性を検討した上記 8 試験に再燃抑制試験を加え総合（計 9 試験）した場合、副作用発現頻度は 51.5%（497/965 例）であった。主な副作用は悪心 13.2%（127/965 例）、傾眠 12.3%（119/965 例）、口内乾燥 10.2%（98/965 例）、頭痛 6.8%（66/965 例）及び下痢 5.0%（48/965 例）であった<sup>5)~7)</sup>。

##### ②国内第Ⅲ相試験

主要評価項目であるセルトラリンの再燃率は 8.5%（10/117 例）であり、プラセボの 19.5%（23/118 例）に比べ、統計的に有意に低かった。また、Kaplan-Meier 法による再燃-時間の推定曲線から、セルトラリンの再燃率は二重盲検期を通してプラセボに比べて統計的に有意に低く推移した。副次的評価項目であるハミルトンうつ病評価尺度（HAM-D）合計点はプラセボに比べて統計的に有意に少なく、Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire（Q-LES-Q）スコアにおいてもプラセボに比べて統計的に有意な改善が、二重盲検期において認められた<sup>8)</sup>。

有効性評価項目の成績

	セルトラリン群 (症例数：117 <sup>a)</sup> )		プラセボ群 (症例数：118)	
	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時
HAM-D 合計 点 <sup>b)</sup>	8.3±3.4	6.3±6.2	8.1±3.3	9.7±7.2
全般改善度 における改善率	81.2% (95/117)	84.6% (99/117)	87.3% (103/118)	67.8% (80/118)
Q-LES-Q スコア <sup>b)</sup>	62.9±11.2	67.4±15.3	64.2±10.4	61.3±12.6

a) Q-LES-Q スコアにおける終了・中止時の症例数は 116 例

b) 平均値±標準偏差

副作用発現頻度は、非盲検期 66.2% (239/361 例) であり、主な副作用は悪心、傾眠、口内乾燥、頭痛であった。また、二重盲検期では、セルトラリン群 29.9% (35/117 例)、プラセボ群 31.4% (37/118 例) であった。主な副作用は、セルトラリン群で傾眠、頭痛、浮動性めまい、下痢及び上腹部痛であった<sup>8),9)</sup>。

セルトラリンを用いた治療によって改善の得られたうつ状態の再燃を抑える点でプラセボより優れていることを検証したが、うつ状態の改善における有効性では、すでに発売されている抗うつ薬（トラゾドン塩酸塩及びアミトリプチリン塩酸塩）と同等あるいはそれ以上の効果があることを検証していない。

〈パニック障害〉

③国内第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験

前期第Ⅱ相試験、後期第Ⅱ相試験及びランダム化治療中止試験を総合（計 3 試験）した場合、改善率は 72.7% (352/484 例) であった。初期用量で効果が認められない患者においても、増量することで効果が認められた。

副作用発現頻度は 74.9% (384/513 例) であった。主な副作用は、悪心 29.6% (152/513 例)、傾眠 20.7% (106/513 例)、頭痛 9.6% (49/513 例)、下痢 9.2% (47/513 例)、口内乾燥 7.6% (39/513 例)、浮動性めまい 7.6% (39/513 例)、倦怠感 6.6% (34/513 例)、食欲不振 6.6% (34/513 例)、胃不快感 6.0% (31/513 例)、食欲減退 5.8% (30/513 例) であった<sup>10),11)</sup>。

#### ④国内第Ⅱ相試験

プラセボ群、セルトラリン 25-75mg 群（低用量群）、50-150mg<sup>注)</sup> 群（高用量群）の3群間で二重盲検比較試験が行われた結果、全般改善度ではプラセボ群との間に有意差は認められなかった。また、パニック発作の回数では、投与前の発作回数に群間で不均衡がみられたが、プラセボに比べて高用量群では有意な減少は認められなかったものの、低用量群において有意な減少が認められた。

副作用発現頻度は、低用量群で 55.3% (26/47 例)、高用量群で 56.8% (25/44 例) であった。主な副作用は低用量群で下痢、傾眠及び悪心、高用量群で悪心であった<sup>12)</sup>。

#### ⑤国内第Ⅲ相試験

主要評価項目であるセルトラリンの再燃率は 10.1% (12/119 例) であり、プラセボの 13.2% (16/121 例) に比べて低かったが、有意差は認められなかった。また、Kaplan-Meier 法による再燃-時間の推定曲線から、セルトラリンの再燃率は二重盲検期を通してプラセボに比べて低く推移したが有意な差は認められなかった。副次的評価項目である全般改善度における改善率、パニック発作の回数、パニック障害重症度評価尺度 (PDSS) 合計点においては二重盲検期において、プラセボに比べて統計的に有意な差が認められた。

有効性評価項目の成績

	セルトラリン群 (症例数：119)		プラセボ群 (症例数：121)	
	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時	二重盲検期 開始時	終了・ 中止時
全般改善度における改善率	100% (119/119)	89.9% (107/119)	100% (121/121)	74.4% (90/121)
パニック発作の回数 (回/週) a), b)	0.8±1.7	0.6±1.3	0.9±2.1	1.0±1.8
PDSS 合計点 b)	5.7±3.6	4.3±4.1	6.5±3.7	6.4±4.7

a) 対数変換を施し解析を実施した

b) 平均値±標準偏差

副作用発現頻度は、非盲検期で 81.5% (321/394 例) であり、主な副作用は悪心、傾眠、頭痛であった。また、二重盲検期では、26.9% (32/119 例) であり、主な副作用は悪心、頭痛、初期不眠症、下痢及び寝汗であった<sup>13), 14)</sup>。

注) 本剤の承認用量は 1 日 100mg までである。

#### (5) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後ベース調査、製造販売後臨床試験の内容

〈パニック障害〉

製造販売後臨床試験

パロキセチンを対照とした二重盲検比較試験（製造販売後臨床試験）における主要評価項目である 12 週・中止時の Panic and Agoraphobia Scale (PAS) 合計点において、セルトラリンの有効性はパロキセチンと同程度であった<sup>15)</sup>。

Panic and Agoraphobia Scale (PAS) 合計点 (Efficacy Evaluable Set)

対象例数	セルトラリン	パロキセチン
	120	117
調整済み平均 <sup>a)</sup> (95%信頼区間)	-17.5 (-19.0, -16.0)	-16.7 (-18.2, -15.1)
調整済み平均の差 <sup>a)</sup> (95%信頼区間)	-0.9 (-3.0, 1.3)	

a) ベースラインの PAS 合計点で調整

セルトラリンが投与された治療期の総症例 147 例中 100 例 (68.0%) に 243 件の副作用が発現した。主な副作用は、悪心 30 例 (20.4%)、傾眠 30 例 (20.4%)、下痢 22 例 (15.0%) であった。

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当しない

(7) その他

該当資料なし

## VI. 薬効薬理に関する項目

### 1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

選択的セロトニン再取り込み阻害剤

### 2. 薬理作用

#### (1) 作用部位・作用機序

セルトラリン塩酸塩は脳内セロトニン神経に存在するセロトニン再取り込み機構を強力かつ選択的に阻害する薬物であり、脳内のシナプス間隙におけるセロトニン濃度を高めて持続的にセロトニン神経伝達を亢進するものと考えられる<sup>16)~18)</sup>。

1) ラット脳シナプトゾームを用いた実験における、セルトラリンのセロトニン取り込みに対する50%抑制濃度(IC<sub>50</sub>)は0.058 $\mu$ mol/Lであり、セルトラリンのセロトニン取り込み阻害作用はノルエピネフリン又はドパミン取り込み阻害作用に比べ約20倍選択的であった<sup>18)</sup> (*in vitro*)。

2) ラット又はウシ脳膜標品を用いた試験において、セルトラリンはセロトニン再取り込み部位に高い親和性を示すが、アドレナリン受容体( $\alpha_1$ 、 $\alpha_2$ 、 $\beta$ )、ドパミン受容体、ムスカリン受容体、ヒスタミン受容体(H<sub>1</sub>)、セロトニン受容体(5-HT<sub>1A</sub>、5-HT<sub>1B</sub>、5-HT<sub>1D</sub>、5-HT<sub>2</sub>)、ベンゾジアゼピン受容体への結合親和性は低かった<sup>16)</sup> (*in vitro*)。またマウスにおける脳内ノルアドレナリン神経系、ドパミン神経系及びムスカリン性アセチルコリン神経系の活性化により生ずる行動や症状に影響を及ぼさなかった<sup>16)</sup>。

#### (2) 薬効を裏付ける試験成績

抗うつ作用

- 1) マウスを用いた強制水泳試験において不動時間を短縮した<sup>18)</sup>。
- 2) ラットを用いた強制水泳試験において逃避行動(水車回転数)の減少を抑制した<sup>19)</sup>。
- 3) 嗅球摘出ラットの自発運動の亢進を抑制した<sup>20)</sup>。
- 4) 拘束ストレス負荷による正常ラットの自発運動量の減少を回復させた<sup>21)</sup>。

抗不安作用

- 1) マウスを用いたガラス玉覆い隠し試験においてガラス玉覆い隠し行動を抑制した<sup>22)</sup>。

5-HT<sub>2C</sub>受容体作動薬による自発運動量減少に対する作用

m-クロロフェニルピペラジン(m-CPP)の投与によるラットの自発運動量の減少を軽減した<sup>23)</sup>。

#### (3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

## VII. 薬物動態に関する項目

### 1. 血中濃度の推移

#### (1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

#### (2) 臨床試験で確認された血中濃度

##### 1) 単回投与

健康成人男性（6例）にセルトラリン 50、100 及び 200mg<sup>注)</sup> を食後に単回経口投与した時の最高血漿中濃度 ( $C_{max}$ ) はそれぞれ 15.1、30.8 及び 90.8ng/mL、血漿中濃度－時間曲線下面積 ( $AUC_{0-\infty}$ ) はそれぞれ 0.557、1.081 及び 2.975 $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$  であり用量に伴い増加した。また、血漿中濃度半減期 ( $t_{1/2}$ ) は 50、100 及び 200mg<sup>注)</sup> 投与に対し、それぞれ 22.5、24.1 及び 23.4 時間であった<sup>24)</sup>。

セルトラリン 50、100 及び 200mg<sup>注)</sup> を単回投与した時のセルトラリンの薬物動態パラメータ

投与量 (mg)	n	$C_{max}$ (ng/mL)	$T_{max}$ (hr)	$t_{1/2}$ (hr)	$AUC_{0-\infty}$ ( $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ )
50	6	15.1 $\pm$ 4.3	8.7 $\pm$ 2.1	22.5 $\pm$ 8.1	0.557 $\pm$ 0.261
100	6	30.8 $\pm$ 7.9	6.7 $\pm$ 1.0	24.1 $\pm$ 7.9	1.081 $\pm$ 0.551
200 <sup>注)</sup>	6	90.8 $\pm$ 15.0	6.3 $\pm$ 1.5	23.4 $\pm$ 6.2	2.975 $\pm$ 1.001

(平均値 $\pm$ 標準偏差)

$T_{max}$  : 最高濃度到達時間

##### 2) 反復投与

健康成人男性（6例）にセルトラリン 100mg を 1 日 1 回 10 日間朝食後に反復経口投与した時の血漿中濃度は投与 5 日目には定常状態に達し、10 日間の反復投与により理論値 ( $R=2.0$ ) を超える蓄積 (投与 1 日目:  $C_{max}$  40.5ng/mL、 $AUC_{0-24}$  0.612 $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ 、10 日目:  $C_{max}$  69.9ng/mL、 $AUC_{0-24}$  1.22 $\mu\text{g} \cdot \text{hr/mL}$ ) は認められなかった<sup>25)</sup>。

##### 3) 生物学的同等性試験

###### ●セルトラリン錠 25mg 「TCK」


生物学的同等性試験ガイドライン (薬食審査発 0229 第 10 号 2012 年 2 月 29 日)

セルトラリン錠 25mg 「TCK」とジェイゾロフト錠 25mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (セルトラリンとして 25mg) 健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ ( $AUC$ 、 $C_{max}$ ) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$  の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>26)</sup>。



	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0→80hr</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
セルトラリン錠 25mg 「TCK」	181.94±79.76	7.56±2.89	5.2±0.8	26.2±7.3
ジェイゾロフト錠 25mg	178.82±89.24	7.44±3.45	5.4±0.8	27.5±6.7

(Mean±S.D., n=20)




●セルトラリン錠 50mg 「TCK」

生物学的同等性試験ガイドライン（薬食審査発 0229 第 10 号 2012 年 2 月 29 日）

セルトラリン錠 50mg 「TCK」とジェイゾロフト錠 50mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠（セルトラリンとして 50mg）健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ（AUC、Cmax）について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>27)</sup>。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC <sub>0→80hr</sub> (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)
セルトラリン錠 50mg 「TCK」	426.80±121.58	16.97±4.27	5.3±1.1	30.8±5.5
ジェイゾロフト錠 50mg	414.31±126.91	16.48±4.28	5.4±0.9	31.2±6.0

(Mean±S.D., n=20)



血漿中濃度並びに AUC、C<sub>max</sub> 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

### (3) 中毒域

該当資料なし

### (4) 食事・併用薬の影響

#### 1) 食事の影響

健康成人男性（12例）にセルトラリン 75mg を空腹時及び食後に単回経口投与し、薬物動態を比較した。食後投与時の C<sub>max</sub> は 21.9ng/mL であり、空腹時投与時の 18.1ng/mL に比べて高く、有意な差が認められたものの、AUC<sub>0-∞</sub>、T<sub>max</sub> 及び t<sub>1/2</sub> には有意差は認められなかった<sup>28)</sup>。

#### 2) 併用薬の影響

##### ワルファリン

健康成人男性（15例）にセルトラリン反復投与（50mg/日から 200mg/日<sup>注</sup>）まで増量）前及び投与 22 日目にワルファリン 0.75mg/kg を単回経口投与し、ワルファリンのプロトロンビン反応時間曲線下面積（AUC<sub>0-120</sub>）及び血漿蛋白結合率を比較した。セルトラリンとワルファリンの併用投与により、わずかながら有意な変化が認められた<sup>29),30)</sup>（外国人データ）。[9.1.7,10.2 参照]

##### トルブタミド

健康成人男性（25例）にセルトラリン反復投与（50mg/日から 200mg/日<sup>注</sup>）まで増量）前及び投与 22 日目にトルブタミド 1000mg を単回静脈内投与した時のトルブタミドの薬物動態を検討した。セルトラリンとトルブタミドの併用投与により、トルブタミドのクリアランスに軽度な低下が認められた<sup>31)</sup>（外国人データ）。[10.2 参照]

## シメチジン

健康成人男性（12例）にシメチジン 800mg を 8 日間反復投与し、投与 2 日目にセルトラリン 100mg を単回併用投与した時のセルトラリンの薬物動態を検討した。シメチジンの併用により、プラセボ併用時に比べセルトラリンの  $AUC_{0-\infty}$  は約 50%、 $C_{max}$  及び  $t_{1/2}$  は約 25%増大した<sup>32)</sup>（外国人データ）。[10.2 参照]

注）本剤の承認用量は 1 日 100mg までである。

## 2. 薬物速度論的パラメータ

### (1) 解析方法

該当資料なし

### (2) 吸収速度定数

該当資料なし

### (3) 消失速度定数

該当資料なし

### (4) クリアランス

該当資料なし

### (5) 分布容積

該当資料なし

### (6) その他

該当資料なし

## 3. 母集団（ポピュレーション）解析

### (1) 解析方法

該当資料なし

### (2) パラメータ変動要因

該当資料なし

## 4. 吸収

該当資料なし

## 5. 分布

### (1) 血液－脳関門通過性

該当資料なし

### (2) 血液－胎盤関門通過性

該当資料なし

### (3) 乳汁への移行性

大うつ病を伴う授乳婦（26例）にセルトラリン 25～200mg<sup>注)</sup>を1日1回、14日間以上反復経口投与した時、いずれの授乳婦の乳汁においてもセルトラリンは検出され、乳児の血清においてもセルトラリンが確認された<sup>33)</sup>（外国人データ）。[9.6 参照]

### (4) 髄液への移行性

該当資料なし

### (5) その他の組織への移行性

該当資料なし

### (6) 血漿蛋白結合率

*in vitro* におけるヒト血清蛋白結合率は約 98.5%であった<sup>34)</sup>。

注) 本剤の承認用量は1日 100mg までである。

## 6. 代謝

### (1) 代謝部位及び代謝経路

セルトラリンの主代謝物は N-デスメチルセルトラリンであり、この他にも数種の代謝物が存在する。なお、代謝には CYP2C19、CYP2C9、CYP2B6 及び CYP3A4 など少なくとも 4 種の肝薬物代謝酵素が関与しており、多代謝経路を示す<sup>35)</sup>。[10. 参照]

### (2) 代謝に関与する酵素（CYP等）の分子種、寄与率

本剤は肝代謝酵素 CYP2C19、CYP2C9、CYP2B6 及び CYP3A4 等で代謝される<sup>35)</sup>。[16.4 参照]

### (3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

### (4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

該当資料なし

## 7. 排泄

1) 健康成人男性（6例）にセルトラリン 50、100 及び 200mg<sup>注)</sup>を食後に単回経口投与した時、投与後 24 時間までの未変化体の尿中排泄率はいずれの用量においても約 0.1%であった<sup>24)</sup>。

2) 健康成人男性（外国人、2例）に<sup>14</sup>C-標識セルトラリン 50mg を単回経口投与した時、投与後 9 日目までに尿中に投与放射能の 43.5%（ほとんどが代謝物）が、糞中に 44.5%がそれぞれ排泄された<sup>36)</sup>。

注) 本剤の承認用量は1日 100mg までである。

## 8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

## 9. 透析等による除去率

該当資料なし

## 10. 特定の背景を有する患者

### 腎機能障害患者

腎機能障害患者（24例）にセルトラリン 100mg を食後に単回経口投与した時、セルトラリンの血漿中濃度は腎機能の障害により高くなる傾向を示したが、その上昇の程度は小さかった<sup>37)</sup>（外国人データ）。

### 肝機能障害患者

慢性非活動性肝不全患者（Child-Pugh の分類 A 及び B、10例）にセルトラリン 100mg を単回経口投与した時の血漿中濃度推移は、健康成人と比較して、 $C_{max}$  が約 1.7 倍、 $AUC_{0-\infty}$  が 4.4 倍増加し、 $t_{1/2}$  は 2.3 倍延長した。また、セルトラリン 50mg を肝機能障害患者（改訂 Child-Pugh の分類 A 及び B、10例）に 21 日間反復経口投与した時、単回投与時と同様の傾向が認められた<sup>38)</sup>（外国人データ）。[9.3 参照]

### 高齢者

高齢うつ病患者（日本人、男性 5 例、女性 8 例、65 歳以上）にセルトラリンを 1 日 1 回、最高 6 週間反復経口投与（25mg/日から 75mg/日まで増量）した。高齢者の  $t_{1/2}$ （男性 30.7 時間、女性 35.7 時間）は、健康成人男性の 23.4 時間と比較して長くなる傾向が認められた<sup>25)</sup>、<sup>39)</sup>。高齢者（外国人、男性 11 例、女性 11 例、65 歳以上）及び成人（外国人、男性 11 例、女性 11 例、18～45 歳）にセルトラリンを 1 日 1 回、30 日間反復経口投与（50mg/日から 200mg/日<sup>注)</sup>まで増量）した。成人男性の最終投与後の  $C_{max}$  は 117.5ng/mL であり、高齢者（男性 135.4ng/mL、女性 147.1ng/mL）及び成人女性（165.6ng/mL）に比べ、低かったが、AUC にはいずれの群間でも有意な差は認められなかった<sup>40)</sup>、<sup>41)</sup>。[9.8 参照]

注) 本剤の承認用量は 1 日 100mg までである。

## 11. その他

該当資料なし

## VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

### 1. 警告内容とその理由

設定されていない

### 2. 禁忌内容とその理由

#### 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

2.2 MAO 阻害剤を投与中あるいは投与中止後 14 日間以内の患者 [10.1,11.1.1 参照]

2.3 ピモジドを投与中の患者 [10.1,11.1.8 参照]

### 3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

「V. 治療に関する項目」を参照すること。

### 4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

「V. 治療に関する項目」を参照すること。

### 5. 重要な基本的注意とその理由

#### 8. 重要な基本的注意

〈効能共通〉

8.1 うつ症状を呈する患者は希死念慮があり、自殺企図のおそれがあるので、このような患者は投与開始早期ならびに投与量を変更する際には患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。[5.1,7.,8.2-8.4,9.1.1,9.1.2,9.7.2,9.7.3,15.1.1 参照]

8.2 不安、焦燥、興奮、パニック発作、不眠、易刺激性、敵意、攻撃性、衝動性、アカシジア／精神運動不穏、軽躁、躁病等があらわれることが報告されている。また、因果関係は明らかではないが、これらの症状・行動を来した症例において、基礎疾患の悪化又は自殺念慮、自殺企図、他害行為が報告されている。患者の状態及び病態の変化を注意深く観察するとともに、これらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量せず、徐々に減量し、中止するなど適切な処置を行うこと。[5.1,7.,8.1,8.3,8.4,9.1.1-9.1.4,9.7.2,9.7.3,15.1.1 参照]

8.3 自殺目的での過量服用を防ぐため、自殺傾向が認められる患者に処方する場合には、1 回分の処方日数を最小限にとどめること。[5.1,7.,8.1,8.2,8.4,9.1.1,9.1.2,9.7.2,9.7.3,15.1.1 参照]

8.4 家族等に自殺念慮や自殺企図、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化及び基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう指導すること。[5.1,7.,8.1-8.3,9.1.1-9.1.4,9.7.2,9.7.3,15.1.1 参照]

8.5 眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。

- 8.6 投与中止（突然の中止）により、不安、焦燥、興奮、浮動性めまい、錯感覚、頭痛及び悪心等があらわれることが報告されている。投与を中止する場合には、突然の中止を避け、患者の状態を観察しながら徐々に減量すること。
- 8.7 血小板減少があらわれることがあるので、投与期間中は血液検査を行うこと。[11.1.9 参照]  
〈外傷後ストレス障害〉
- 8.8 外傷後ストレス障害患者においては、症状の経過を十分に観察し、本剤を漫然と投与しないよう、定期的に本剤の投与継続の要否について検討すること。

## 6. 特定の背景を有する患者に関する注意

### (1) 合併症・既往歴等のある患者

- 9.1 合併症・既往歴等のある患者
- 9.1.1 躁うつ病患者  
躁転、自殺企図があらわれることがある。[5.1,7.,8.1-8.4,9.1.2,9.7.2,9.7.3,15.1.1 参照]
- 9.1.2 自殺念慮又は自殺企図の既往のある患者、自殺念慮のある患者  
自殺念慮、自殺企図があらわれることがある。[5.1,7.,8.1-8.4,9.1.1,9.7.2,9.7.3,15.1.1 参照]
- 9.1.3 脳の器質的障害又は統合失調症の素因のある患者  
精神症状を増悪させることがある。[8.2,8.4,9.1.4 参照]
- 9.1.4 衝動性が高い併存障害を有する患者  
精神症状を増悪させることがある。[8.2,8.4,9.1.3 参照]
- 9.1.5 てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者  
痙攣発作を起こすことがある。[11.1.3 参照]
- 9.1.6 QT 延長又はその既往歴のある患者、著明な徐脈や低カリウム血症等がある患者  
QT 延長、心室頻拍 (torsade de pointes を含む) を起こすおそれがある。[10.2,11.1.8 参照]
- 9.1.7 出血の危険性を高める薬剤を併用している患者、出血傾向又は出血性素因のある患者  
鼻出血、胃腸出血、血尿等が報告されている。[10.2,16.7.1 参照]
- 9.1.8 緑内障又はその既往歴のある患者  
眼圧上昇を起こし、症状が悪化するおそれがある。

### (2) 腎機能障害患者

設定されていない

### (3) 肝機能障害患者

- 9.3 肝機能障害患者  
血中濃度半減期が延長し、AUC 及び  $C_{max}$  が増大することがある。[16.6.2 参照]

(4) 生殖能を有する者

設定されていない

(5) 妊婦

9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

9.5.1 妊娠末期に本剤あるいは他の SSRI、SNRI が投与された女性が出産した新生児において、入院期間の延長、呼吸補助、経管栄養を必要とする、離脱症状と同様の症状が出産直後にあらわれたとの報告がある。臨床所見としては、呼吸窮迫、チアノーゼ、無呼吸、発作、体温調節障害、哺乳障害、嘔吐、低血糖症、筋緊張低下、筋緊張亢進、反射亢進、振戦、ぴくつき、易刺激性、持続性の泣きが報告されている。

9.5.2 海外の疫学調査において、妊娠中に本剤を含む SSRI を投与された女性が出産した新生児において、新生児遷延性肺高血圧症のリスクが増加したとの報告がある<sup>42),43)</sup>。このうち1つの調査では、妊娠34週以降に生まれた新生児における新生児遷延性肺高血圧症発生のリスク比は、妊娠早期の投与では2.4 (95%信頼区間1.2-4.3)、妊娠早期及び後期の投与では3.6 (95%信頼区間1.2-8.3)であった<sup>43)</sup>。

(6) 授乳婦

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている<sup>33)</sup>。[16.3.2 参照]

(7) 小児等

9.7 小児等

9.7.1 小児等を対象とした国内臨床試験は実施していない。

9.7.2 海外で実施された6～17歳の大うつ病性障害 (DSM-IV<sup>注)</sup>における分類) を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験において有効性が確認できなかったとの報告がある。また、本剤群でみられた自殺企図 [1.1% (2/189例)] は、プラセボ群 [1.1% (2/184例)] と同様であり、自殺念慮は本剤群で1.6% (3/189例) にみられた。これらの事象と本剤との関連性は明らかではない<sup>44)</sup> (海外において本剤は小児大うつ病性障害患者に対する適応を有していない)。[5.1, 5.2, 8.1-8.4, 9.1.1, 9.1.2, 15.1.1 参照]



9.7.3 海外で実施された6～17歳の外傷後ストレス障害(DSM-IV<sup>注</sup>)における分類)を対象としたプラセボ対照二重盲検比較試験において有効性が確認できなかったとの報告がある。当該試験にて自殺企図はみられなかったが、自殺念慮は本剤群でのみ4.5% (3/67例)にみられた<sup>45)</sup>(海外において本剤は小児外傷後ストレス障害患者に対する適応を有していない)。<sup>[5.1, 5.3, 8.1-8.4, 9.1.1, 9.1.2, 15.1.1 参照]</sup>

注) DSM-IV: American Psychiatric Association (米国精神医学会)の Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition (DSM-IV 精神疾患の診断・統計マニュアル)

(8) 高齢者

9.8 高齢者

高齢者においては、肝機能、腎機能の低下を考慮し、用量等に注意して慎重に投与すること。本剤は、主として肝臓で代謝されるが、高齢者では肝機能が低下していることが多いため、高い血中濃度が持続し、出血傾向の増強等がおこるおそれがある。<sup>[16.6.3 参照]</sup>

7. 相互作用

10. 相互作用

本剤は肝代謝酵素 CYP2C19、CYP2C9、CYP2B6 及び CYP3A4 等で代謝される<sup>35)</sup>。<sup>[16.4 参照]</sup>

(1) 併用禁忌とその理由

10.1. 併用禁忌 (併用しないこと)

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
MAO 阻害剤 セレギリン塩酸塩 (エフピー) ラサギリンメシル酸塩 (アジレクト) サフィナミドメシル酸塩 (エクフイナ) [2.2, 11.1.1 参照]	発汗、不穏、全身痙攣、異常高熱、昏睡等の症状があらわれることがある。なお、MAO 阻害剤の投与を受けた患者に本剤を投与する場合、また本剤投与後に MAO 阻害剤を投与する場合には、14 日間以上の間隔をおくこと。	セロトニンの分解が阻害され、脳内セロトニン濃度が高まると考えられる。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ピモジド（オーラップ） [2.3,11.1.8 参照]	ピモジドとの併用により、ピモジドの AUC 及び C <sub>max</sub> がそれぞれ 1.4 倍増加したとの報告がある <sup>46)</sup> 。 ピモジドは QT 延長を引き起こすことがあるので本剤と併用しないこと。	機序不明

(2) 併用注意とその理由

10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー） [11.1.1 参照]	セロトニン症候群があらわれるおそれがある。	左記薬剤の MAO 阻害作用によりセロトニン作用が増強されると考えられる。
リネゾリド [11.1.1 参照]	セロトニン症候群の症状（錯乱、協調運動障害、血圧上昇等）があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、本剤と併用薬の両方あるいはいずれか一方の投与を中止するなど適切な処置を行うこと。	リネゾリドは非選択的、可逆的 MAO 阻害作用を有する。
5-HT <sub>1B/1D</sub> 受容体作動薬 スマトリプタン コハク酸塩 ゾルミトリプタン エレトリプタン 臭化水素酸塩	脱力、反射亢進、協調運動障害、錯乱、不安、焦燥、興奮があらわれることがある。	相互に作用を増強させるおそれがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
トラマドール塩酸塩含有製剤 メサドン塩酸塩 ペンタゾシン含有製剤 ベチジン塩酸塩含有製剤 タベンタドール塩酸塩 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物含有製剤 フェンタニル含有製剤	セロトニン作用が増強されるおそれがある。	これらの薬剤はセロトニン作用を有する。
L-トリプトファンを含有する製剤 アミノ酸製剤 経腸成分栄養剤		L-トリプトファンはセロトニンの前駆物質であるため、脳内セロトニン濃度が高まるおそれがある。
セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）含有食品		セイヨウオトギリソウ（St.John's Wort、セント・ジョーンズ・ワート）はセロトニン作用を有する。
炭酸リチウム	セロトニンに関連した副作用（振戦等）が増大するおそれがある。	相互に作用を増強させるおそれがある。
三環系抗うつ剤 クロミプラミン塩酸塩 イミプラミン塩酸塩 アミトリプチリン塩酸塩	薬剤の血中濃度が上昇し、作用が増強されるおそれがある。	本剤がこれらの薬剤の代謝を阻害することがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ワルファリン [9.1.7,16.7.1 参照]	ワルファリンのプロトロンビン反応時間曲線下面積が軽度増加(8%)したとの報告がある <sup>29)</sup> 。 本剤の投与を開始もしくは中止する場合は、プロトロンビン時間を慎重にモニターすること。	機序不明
出血傾向が増強する薬剤 非定型抗精神病剤 フェノチアジン系薬剤 三環系抗うつ剤 アスピリン等の非ステロイド系抗炎症剤 ワルファリン等 [9.1.7,16.7.1 参照]	異常出血(鼻出血、胃腸出血、血尿等)が報告されているので、注意して投与すること。	SSRI の投与により血小板凝集能が阻害され、これらの薬剤との併用により出血傾向が増大することがある。
血糖降下薬 トルブタミド [16.7.2 参照]	トルブタミドのクリアランスが減少(16%)したとの報告がある <sup>31)</sup> 。	本剤がこの薬剤の代謝を阻害するためと考えられる。
シメチジン [16.7.3 参照]	本剤の AUC 及び C <sub>max</sub> の増大(50%、24%)及び t <sub>1/2</sub> の延長(26%)がみられたとの報告がある <sup>32)</sup> 。	本剤の代謝が阻害されたためと考えられる。
アルコール (飲酒)	本剤投与中は、飲酒を避けることが望ましい。	本剤との相互作用は認められていないが、他の抗うつ剤で作用の増強が報告されている。
QT 延長を起こすことが知られている薬剤 [9.1.6,11.1.8 参照]	QT 延長を起こすおそれがある。	併用により QT 延長作用が相加的に増加するおそれがある。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
スルピリン水和物	本剤の血漿中濃度が低下し、有効性が減弱するおそれがある。	併用により CYP2B6 及び CYP3A4 が誘導され、本剤の代謝が促進されるためと考えられる。

## 8. 副作用

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### (1) 重大な副作用と初期症状

##### 11.1 重大な副作用

###### 11.1.1 セロトニン症候群（頻度不明）

不安、焦燥、興奮、錯乱、発汗、下痢、発熱、高血圧、固縮、頻脈、ミオクロヌス、自律神経不安定等があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。

[2.2,10.1,10.2 参照]

###### 11.1.2 悪性症候群（頻度不明）

無動緘黙、強度の筋強剛、嚥下困難、頻脈、血圧の変動、発汗等が発現し、それに引き続き発熱がみられる場合がある。抗精神病剤との併用時にあらわれることが多いため、特に注意すること。異常が認められた場合には、抗精神病剤及び本剤の投与を中止し、体冷却、水分補給等の全身管理とともに適切な処置を行うこと。本症発現時には、白血球の増加や血清 CK の上昇がみられることが多く、また、ミオグロビン尿を伴う腎機能の低下がみられることがある。

###### 11.1.3 痙攣（頻度不明）、昏睡（頻度不明）

[9.1.5 参照]

###### 11.1.4 肝機能障害（頻度不明）

肝不全、肝炎、黄疸があらわれることがあるので、必要に応じて肝機能検査を行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

###### 11.1.5 抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）（頻度不明）

低ナトリウム血症、低浸透圧血症、尿中ナトリウム排泄量の増加、高張尿、痙攣、意識障害等を伴う抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（SIADH）があらわれることがあるので、異常が認められた場合には投与を中止し、水分摂取の制限等適切な処置を行うこと。

11.1.6 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis：TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）  
異常が認められた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

11.1.7 アナフィラキシー（頻度不明）  
アナフィラキシー（呼吸困難、喘鳴、血管浮腫等）があらわれることがある。

11.1.8 QT 延長（頻度不明）、心室頻拍（torsade de pointes を含む）（頻度不明）  
[2.3,9.1.6,10.1,10.2 参照]

11.1.9 血小板減少（頻度不明）  
47) [8.7 参照]

(2) その他の副作用

11.2 その他の副作用			
	1%以上	1%未満	頻度不明
精神系	睡眠障害(不眠等)、錯乱状態	悪夢、易刺激性、易興奮性、うつ病、躁病、精神症、多幸症、リビドー減退、記憶障害、注意力障害	攻撃的反応、不安、焦燥、興奮、幻覚
神経系	傾眠(15.2%)、頭痛、浮動性めまい、振戦、感覚減退	起立性めまい、味覚異常、頭部不快感、運動障害(アカシジア、錐体外路症状、運動過多、歯ぎしり、歩行異常等)、錯感覚	不随意性筋収縮、ジスキネジー、ジストニー、片頭痛、失神
感覚器		調節障害、視覚異常(霧視、羞明、視力低下等)、耳鳴、耳閉感、回転性眩暈	散瞳
循環器	動悸	起立性低血圧、血圧低下、血圧上昇、頻脈	
肝臓	ALT 増加、AST 増加、 $\gamma$ -GTP 増加	LDH 増加、Al-P 増加、総ビリルビン増加、直接ビリルビン増加	

	1%以上	1%未満	頻度不明
血液		白血球数増加又は減少、単球増加、出血傾向（鼻出血、胃腸出血、血尿等）	血小板機能異常、紫斑、斑状出血、皮下出血
消化器系	悪心・嘔吐(20.3%)、口内乾燥、下痢・軟便、便秘、腹部不快感、腹痛、腹部膨満、消化不良、食欲不振	胃腸障害、食欲亢進	膵炎
過敏症	発疹	蕁麻疹、そう痒症、顔面浮腫、眼窩周囲浮腫	光線過敏性反応
泌尿器・生殖器		排尿困難、尿閉、頻尿、性機能障害（射精遅延、持続勃起症等）、月経障害	尿失禁・夜尿、乳汁漏出症、女性化乳房
筋・骨格系		背部痛、関節痛、筋緊張異常（筋硬直、筋緊張亢進、筋痙攣等）	開口障害
代謝・内分泌		総蛋白減少、総コレステロール増加、尿糖、尿蛋白	甲状腺機能低下症、低ナトリウム血症、高プロラクチン血症、血糖異常
その他	倦怠感、多汗（発汗、寝汗等）	無力症、熱感、異常感、胸痛、胸部圧迫感、疲労、発熱、ほてり、悪寒、体重減少、体重増加、末梢性浮腫、あくび、脱毛症	気管支痙攣、好酸球性肺炎

## 9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

## 10. 過量投与

### 13. 過量投与

本剤の過量投与、又は本剤の過量投与と他剤やアルコールとの併用による死亡例が海外で報告されている。

#### 13.1 症状

傾眠、胃腸障害（悪心・嘔吐等）、頻脈、振戦、不安、焦燥、興奮、浮動性めまいのようなセロトニン性の副作用であり、まれに昏睡が認められた。

#### 13.2 処置

特異的な解毒剤は知られていない。活性炭投与等の適切な処置を行うこと。催吐は薦められない。本剤は分布容積が大きいので、強制利尿、透析、血液灌流及び交換輸血はあまり効果的でない。

## 11. 適用上の注意

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

## 12. その他の注意

### (1) 臨床使用に基づく情報

#### 15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 海外で実施された大うつ病性障害等の精神疾患を有する患者を対象とした、本剤を含む複数の抗うつ剤の短期プラセボ対照臨床試験の検討結果において、24 歳以下の患者では、自殺念慮や自殺企図の発現のリスクが抗うつ剤投与群でプラセボ群と比較して高かった。

なお、25 歳以上の患者における自殺念慮や自殺企図の発現のリスクの上昇は認められず、65 歳以上においてはそのリスクが減少した。[5.1,7.,8.1-8.4,9.1.1,9.1.2,9.7.2,9.7.3 参照]

15.1.2 主に 50 歳以上を対象に実施された海外の疫学調査において、選択的セロトニン再取り込み阻害剤及び三環系抗うつ剤を含む抗うつ剤を投与された患者で、骨折のリスクが上昇したとの報告がある。

15.1.3 海外で実施された臨床試験において、本剤を含む選択的セロトニン再取り込み阻害剤が精子特性を変化させ、受精率に影響を与える可能性が報告されている<sup>48), 49)</sup>。

15.1.4 電気けいれん療法との併用については、その有効性及び安全性が確立されていない。



(2) 非臨床試験に基づく情報  
設定されていない

## IX. 非臨床試験に関する項目

### 1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験（「VI. 薬効薬理に関する項目」参照）

(2) 安全性薬理試験

該当資料なし

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

### 2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

該当資料なし

## X. 管理的事項に関する項目

### 1. 規制区分

製剤：セルトラリン錠 25mg 「TCK」

セルトラリン錠 50mg 「TCK」

劇薬、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

有効成分：セルトラリン塩酸塩 劇薬、処方箋医薬品

### 2. 有効期間

有効期間：3年

### 3. 包装状態での貯法

室温保存

### 4. 取扱い上の注意

設定されていない

### 5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド：有り

くすりのしおり：有り

その他の患者用資料：セルトラリン錠「TCK」を服用される患者さまとご家族の方へ  
(辰巳化学株式会社ホームページ 医療関係者向け情報

[https://www.tatsumi-kagaku.com/public/info\\_medical/information.php](https://www.tatsumi-kagaku.com/public/info_medical/information.php) 参照)

### 6. 同一成分・同効薬

同一成分薬：ジェイゾロフト錠 25mg/錠 50mg/錠 100mg

同効薬：フルボキサミンマレイン酸塩、パロキセチン塩酸塩 など

### 7. 国際誕生年月日

該当資料なし

### 8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

販売名	製造販売承認年月日	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
セルトラリン錠 25mg 「TCK」	2015年8月17日	22700AMX00985000	2015年12月11日	2015年12月11日
セルトラリン錠 50mg 「TCK」	2015年8月17日	22700AMX00986000	2015年12月11日	2015年12月11日

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

●セルトラリン錠 25mg 「TCK」／錠 50mg 「TCK」

2016年3月9日

「外傷後ストレス障害」の効能又は効果追加

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード

販売名	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	HOT番号 (9桁)	レセプト電算処理 システム用コード
セルトラリン錠 25mg 「TCK」	1179046F1010	1179046F1052	124516502	622451601
セルトラリン錠 50mg 「TCK」	1179046F2016	1179046F2059	124517202	622451701

14. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

## XI. 文献

### 1. 引用文献

- 1) 社内資料：安定性試験（錠 25mg）
- 2) 社内資料：安定性試験（錠 50mg）
- 3) 社内資料：溶出試験（錠 25mg）
- 4) 社内資料：溶出試験（錠 50mg）
- 5) 有効性のまとめ、うつ病及びうつ状態のまとめ（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.2.(1).1))
- 6) うつ病及びうつ状態を対象とした臨床試験・第III相試験（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(2).1)③）
- 7) 安全性のまとめ（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.2.(2)）
- 8) Kamijima,K.et al. : Int Clin Psychopharmacol. 2006 ; 21 (1) : 1-9
- 9) うつ病及びうつ状態を対象とした臨床試験・ランダム化治療中止試験(ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(2).1) . ④)
- 10) 臨床試験成績のまとめ、パニック障害（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.2.(1).2))
- 11) 安全性のまとめ（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.2.(2)）
- 12) パニック障害を対象とした臨床試験・後期第II相試験（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(3).1) . ②)
- 13) Kamijima,K.et al. : Int Clin Psychopharmacol.2005 ; 20 (5) : 265-273
- 14) パニック障害を対象とした臨床試験・ランダム化治療中止試験（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ト.1.(3).1) . ③)
- 15) 製造販売後試験の概要（ジェイゾロフト錠：2016年3月25日承認、再審査報告書）
- 16) 各種受容体に対する作用（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要ホ.1.(2).5))
- 17) Sprouse,J.et al. : Neuropsychopharmacology. 1996 ; 14 (4) : 225-231
- 18) Koe,B.K.et al. : J Pharmacol Exp Ther. 1983 ; 226 (3) : 686-700
- 19) Tadokoro,C.et al. : Psychopharmacology. 1997 ; 130 (2) : 124-130
- 20) Butler,J.et al. : Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1988 ; 12 (5) : 585-594
- 21) Kennett,G.A.et al. : Eur J Pharmacol. 1987 ; 134 (3) : 265-274
- 22) 山中 教造ほか：神経精神薬理. 1997 ; 19 (6) : 387-393
- 23) Kennedy,A.J.et al. : Psychopharmacology. 1993 ; 113 (2) : 262-268
- 24) 上島 国利ほか：神経精神薬理. 1997 ; 19 (6) : 395-423
- 25) 上島 国利ほか：神経精神薬理. 1997 ; 19 (6) : 425-447
- 26) 社内資料：生物学的同等性試験（錠 25mg）
- 27) 社内資料：生物学的同等性試験（錠 50mg）
- 28) 上島 国利ほか：神経精神薬理. 1997 ; 19 (6) : 461-470
- 29) Apseloff,G.et al. : Clin Pharmacokinet. 1997 ; 32 (Suppl.1) : 37-42
- 30) 薬物相互作用（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、審査報告書）
- 31) Tremaine,L.M.et al. : Clin Pharmacokinet. 1997 ; 32 (Suppl.1) : 31-36
- 32) シメチジンとの薬物相互作用（ジェイゾロフト錠：2006年4月20日承認、申請資料概要へ.3.(4).3))

- 33) Stowe,Z.N.et al. : J Clin Psychiatry. 2003 ; 64 (1) : 73-80
- 34) 血清蛋白結合 (ジェイゾロフト錠: 2006 年 4 月 20 日承認、申請資料概要へ.2. (2) .4)
- 35) Obach,R.S.et al. : Drug Metab Dispos. 2005 ; 33 (2) : 262-270
- 36) 血漿及び尿・糞中代謝物 (ジェイゾロフト錠: 2006 年 4 月 20 日承認、申請資料概要へ.3. (3) .1))
- 37) 腎機能低下者における試験 (ジェイゾロフト錠: 2006 年 4 月 20 日承認、申請資料概要へ.3. (5) .1))
- 38) 肝機能低下者における試験 (ジェイゾロフト錠: 2006 年 4 月 20 日承認、申請資料概要へ.3. (5) .2))
- 39) 上島 国利ほか: 神経精神薬理. 1997 ; 19 (6) : 569-585
- 40) Ronfeld,R.A.et al. : Clin Pharmacokinet. 1997 ; 32 (Suppl.1) : 22-30
- 41) 高齢者における試験 (ジェイゾロフト錠: 2006 年 4 月 20 日承認、申請資料概要へ.3. (1) .4))
- 42) Chambers,C.D.et al. : N Engl J Med. 2006 ; 354 (6) : 579-587
- 43) Källén,B.et al. : Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2008 ; 17 (8) : 801-806
- 44) Wagner,K.D.et al. : JAMA. 2003 ; 290 (8) : 1033-1041
- 45) Robb,A.S.et al. : J Child Adolesc Psychopharmacol.2010 ; 20 (6) : 463-471
- 46) Alderman,J. : Clin Ther. 2005 ; 27 (7) : 1050-1063
- 47) MID-NET<sup>®</sup>を用いた調査結果の概要 (MID-NET<sup>®</sup>を用いた抗うつ薬による血小板減少指標への影響評価) : <https://www.pmda.go.jp/files/000265771.pdf>
- 48) Safarinejad,M.R. : J Urol. 2008 ; 180 (5) : 2124-2128
- 49) Tanrikut,C.et al. : Fertil Steril. 2010 ; 94 (3) : 1021-1026

## 2. その他の参考文献

該当資料なし

## XII. 参考資料

### 1. 主な外国での発売状況

該当しない

### 2. 海外における臨床支援情報

該当資料なし

### XIII. 備考

#### 1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

本項の情報に関する注意：本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可否を示すものではない。

##### (1) 粉砕

##### 粉砕時の安定性試験結果

##### ●セルトラリン錠 25mg 「TCK」

保存条件	試験項目	規格	結果		
			開始時	2週間	4週間
25±2℃ 75±5%RH 遮光 開放	外観	(参考)	白色の粉末	変化なし	変化なし
	定量*1 (%)	95.0%~105.0%	99.9	99.6	99.8

\*1 n=3 の平均値

##### ●セルトラリン錠 50mg 「TCK」

保存条件	試験項目	規格	結果		
			開始時	2週間	4週間
25±2℃ 75±5%RH 遮光 開放	性状	(参考)	白色の粉末	変化なし	変化なし
	定量*1 (%)	95.0%~105.0%	99.2	99.4	99.9

\*1 n=3 の平均値



## (2) 崩壊・懸濁性および経管投与チューブの通過性

「内服薬 経管投与ハンドブック 第二版(監修:藤島一郎、執筆:倉田なおみ)、じほう」を参考に、製剤の崩壊・懸濁性および経管投与チューブの通過性の試験を行った。

### 試験方法

ディスペンサーのピストン部を抜き取り、ディスペンサー内に製剤をそのまま1個入れてピストンを戻し、ディスペンサーに55°Cの温湯20mLを吸い取り、筒先に蓋をして5分間自然放置する。5分後にディスペンサーを手で90度15往復横転し、崩壊懸濁の状況を観察する。5分後に崩壊しない場合、更に5分間放置後、同様の操作を行う。それでも崩壊懸濁しない場合は、この方法を中止する。中止した製品は、破壊(乳棒で数回叩く)後、上述と同様の操作を行う。

得られた懸濁液を経管チューブの注入端より、約2~3mL/secの速度で注入し、通過性を観察する。体内挿入端から3分の2を水平にし、他端(注入端)を30cmの高さにセットする。注入後に適量の水を注入して経管チューブ内を洗うとき、経管チューブ内に残存物がみられなければ、通過性に問題なしとする。

### 判定方法

水(約55°C)

製剤を55°Cの温湯20mLに入れ、5分または10分放置後に攪拌したときの通過性

破壊→水

製剤を破壊した後に、55°Cの温湯20mLに入れ、5分または10分放置後に攪拌したときの通過性

○: 経管チューブを通過

△: 時間をかければ崩壊しそうな状況、または経管チューブを閉塞する危険性がある

×: 通過困難

### 結果

●セルトラリン錠25mg「TCK」

経管チューブサイズ	水(約55°C)		破壊→水	
	5分	10分	5分	10分
8Fr.	○			

●セルトラリン錠 50mg 「TCK」

通過サイズ	水 (約 55°C)		破壊→水	
	5分	10分	5分	10分
8Fr.	△	△	△	△
12Fr.	○			

2. その他の関連資料

該当資料なし