

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会の IF 記載要領 2018（2019年更新版）に準拠して作成

非ステロイド性消炎・鎮痛剤（COX-2 選択的阻害剤）
セレコキシブ錠セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」
セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」

Celecoxib Tablets

剤形	素錠
製剤の規制区分	劇薬、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
規格・含量	セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」 ：1錠中 日局 セレコキシブを 100mg 含有 セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」 ：1錠中 日局 セレコキシブを 200mg 含有
一般名	和名：セレコキシブ（JAN） 洋名：Celecoxib（JAN）
製造販売承認年月日 薬価基準収載・ 販売開始年月日	製造販売承認年月日：2020年2月17日 薬価基準収載年月日：2020年6月19日 発売年月日：2020年6月19日
開発・製造販売（輸入）・ 提携・販売会社名	製造販売元：株式会社フェルゼンファーマ
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	株式会社フェルゼンファーマ 安全管理部 TEL：03-6368-5160、FAX：03-3580-1522 医療関係者向けホームページ https://www.feldsenpharma.co.jp

本 IF は 2024 年 10 月改訂（第 2 版）の電子添文の記載に基づき改訂した。

最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認して下さい。

医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 —日本病院薬剤師会—

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、IF と略す）が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF記載要領2008以降、IFはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したIFが速やかに提供されることとなった。最新版のIFは、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情報検索のページ（<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>）にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のIFの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせて、「IF記載要領2018」が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IFに記載する項目配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

3. IFの利用にあたって

電子媒体のIFは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってIFを作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V.5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」、「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

IFを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。IFは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の広告規制や販売情報提供活動ガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがIFの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならない。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、IFを利用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

(2020年4月改訂)

目 次

I. 概要に関する項目	1	2. 禁忌内容とその理由	22
1. 開発の経緯	1	3. 効能又は効果に関連する注意とその理由	22
2. 製品の治療学的特性	1	4. 用法及び用量に関連する注意とその理由	22
3. 製品の製剤学的特性	1	5. 重要な基本的注意とその理由	22
4. 適正使用に関して周知すべき特性	1	6. 特定の背景を有する患者に関する注意	23
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	1	7. 相互作用	24
6. RMPの概要	2	8. 副作用	25
II. 名称に関する項目	3	9. 臨床検査結果に及ぼす影響	27
1. 販売名	3	10. 過量投与	27
2. 一般名	3	11. 適用上の注意	28
3. 構造式又は示性式	3	12. その他の注意	28
4. 分子式及び分子量	3	IX. 非臨床試験に関する項目	29
5. 化学名（命名法）又は本質	3	1. 薬理試験	29
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	3	2. 毒性試験	29
III. 有効成分に関する項目	4	X. 管理的事項に関する項目	30
1. 物理化学的性質	4	1. 規制区分	30
2. 有効成分の各種条件下における安定性	4	2. 有効期間	30
3. 有効成分の確認試験法、定量法	4	3. 包装状態での貯法	30
IV. 製剤に関する項目	5	4. 取扱い上の注意	30
1. 剤形	5	5. 患者向け資材	30
2. 製剤の組成	5	6. 同一成分・同効薬	30
3. 添付溶解液の組成及び容量	5	7. 国際誕生年月日	30
4. 力価	6	8. 製造販売承認年月日及び承認番号、 薬価基準収載年月日、販売開始年月日	30
5. 混入する可能性のある夾雑物	6	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更 追加等の年月日及びその内容	30
6. 製剤の各種条件下における安定性	6	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及び その内容	30
7. 調製法及び溶解後の安定性	10	11. 再審査期間	30
8. 他剤との配合変化（物理化学的変化）	10	12. 投薬期間制限に関する情報	30
9. 溶出性	11	13. 各種コード	31
10. 容器・包装	12	14. 保険給付上の注意	31
11. 別途提供される資材類	12	XI. 文献	32
12. その他	12	1. 引用文献	32
V. 治療に関する項目	14	2. その他の参考文献	32
1. 効能又は効果	14	XII. 参考資料	33
2. 効能又は効果に関連する注意	14	1. 主な外国での発売状況	33
3. 用法及び用量	14	2. 海外における臨床支援情報	33
4. 用法及び用量に関連する注意	14	XIII. 備考	34
5. 臨床成績	14	1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行う にあたっての参考情報	34
VI. 薬効薬理に関する項目	16	2. その他の関連資料	38
1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	16		
2. 薬理作用	16		
VII. 薬物動態に関する項目	17		
1. 血中濃度の推移	17		
2. 薬物速度論的パラメータ	19		
3. 母集団（ポピュレーション）解析	19		
4. 吸収	19		
5. 分布	19		
6. 代謝	20		
7. 排泄	21		
8. トランスポーターに関する情報	21		
9. 透析等による除去率	21		
10. 特定の背景を有する患者	21		
11. その他	21		
VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目	22		
1. 警告内容とその理由	22		

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

セレコキシブ錠 100mg「フェルゼン」およびセレコキシブ錠 200mg「フェルゼン」は、株式会社フェルゼンファーマが後発医薬品として開発を企画し、「医薬品の承認申請について（平成 26 年 11 月 21 日薬食発 1121 第 2 号）」に基づき本製剤の規格および試験方法が設定された。その後、安定性試験、生物学的同等性試験等で得られた成績に基づき申請を行い、2020 年 2 月に製造販売承認を取得し、2020 年 6 月に販売を開始した。

本製剤は、後発医薬品として、株式会社フェルゼンファーマ、第一三共エスファ株式会社およびダイト株式会社の 3 社で共同開発を実施し、共同開発グループとして実施したデータを共有し、承認を得た後、上市に至った。

2. 製品の治療学的特性

(1) セレコキシブは、シクロオキシゲナーゼ (COX) に対する阻害活性を検討するためのヒト遺伝子組換え酵素を用いた実験及び COX-1、COX-2 をそれぞれ発現したヒト由来細胞を用いた実験において、COX-2 に対して選択的な阻害作用を示した (in vitro 試験)^{1,2)}。セレコキシブは、炎症局所に誘導される COX-2 を選択的に阻害し COX-2 由来のプロスタグランジン類の合成を抑制することにより、消炎・鎮痛作用を示すと考えられる。（「VI-2. 薬理作用」の項参照）

(2) 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

重大な副作用として、ショック、アナフィラキシー、消化性潰瘍、消化管出血、消化管穿孔、心筋梗塞、脳卒中、心不全、うっ血性心不全、肝不全、肝炎、肝機能障害、黄疸、再生不良性貧血、汎血球減少症、無顆粒球症、急性腎障害、間質性腎炎、中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群)、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、剥脱性皮膚炎、間質性肺炎が報告されている。（「VIII-8. 副作用」の項参照）

3. 製品の製剤学的特性

(1) 錠剤

識別性向上のため、「成分名」「含量 (mg 数)」および「屋号」を両面に印字。（「IV-1. 剤形」の項参照）

(2) PTP シート

ピッチ印刷を採用し、表面には 1 錠単位で成分名と規格を、また裏面には 1 錠単位で販売名および GS1 コードを表示し、判別を容易にしている。

(3) 個装箱

利便性向上の点より、切り取りタグを設けている。

4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、 最適使用推進ガイドライン 等	有無
RMP	無
追加のリスク最小化活動として作成されている資材	無
最適使用推進ガイドライン	無
保険適用上の留意事項通知	無

5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

(1) 承認条件

該当しない

(2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

6. RMP の概要

該当しない

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

セレコキシブ錠100mg 「フェルゼン」

セレコキシブ錠200mg 「フェルゼン」

(2) 洋名

Celecoxib Tablets 100mg [Feldsenf]

Celecoxib Tablets 200mg [Feldsenf]

(3) 名称の由来

有効成分の一般名 + 剤形 + 含量 + 「屋号」として命名した。

2. 一般名

(1) 和名 (命名法)

セレコキシブ (JAN)

(2) 洋名 (命名法)


Celecoxib (JAN)

celecoxib (INN)

(3) ステム

選択的COX阻害剤: -coxib

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式: C₁₇H₁₄F₃N₃O₂S

分子量: 381.37

5. 化学名 (命名法) 又は本質

4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide(IUPAC)

6. 慣用名, 別名, 略号, 記号番号

なし

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色の粉末又は結晶性の粉末である。
結晶多形が認められる。

(2) 溶解性

溶 媒	日本薬局方の溶解度表記
メタノール	溶けやすい
エタノール (99.5)	やや溶けやすい
水	ほとんど溶けない

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点 (分解点), 沸点, 凝固点

融点: 161~164°C

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法, 定量法

確認試験法

日本薬局方「セレコキシブ」による

- (1) 紫外可視吸光度測定法
- (2) 赤外吸収スペクトル測定法 (臭化カリウム錠剤法)

定量法

日本薬局方「セレコキシブ」の定量法による。

・液体クロマトグラフィー




IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区別

販売名	セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」	セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」
剤形	素錠（割線入り）	

(2) 製剤の外観及び性状

販売名	セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」	セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」												
色・剤形	白色・円形の素錠（割線入り）	白色・楕円形の素錠（割線入り）												
形状	<table border="0"> <tr> <td>表</td> <td>裏</td> <td>側面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表	裏	側面				<table border="0"> <tr> <td>表</td> <td>裏</td> <td>側面</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	表	裏	側面			
表	裏	側面												
														
表	裏	側面												
														
直径	8.1 mm	長径 13.1 mm 短径 6.6 mm												
厚さ	2.7 mm	5.2 mm												
質量	180 mg	360 mg												

(3) 識別コード

該当しない

(4) 製剤の物性

該当資料なし

(5) その他

該当資料なし

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量及び添加剤

販売名	セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」	セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」
有効成分	1錠中 日局セレコキシブ 100mg	1錠中 日局セレコキシブ 200mg
添加剤	乳糖水和物、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ラウリル硫酸ナトリウム、ステアリン酸マグネシウム	

(2) 電解質等の濃度

該当しない

(3) 熱量

該当資料なし

3. 添付溶解液の組成及び容量

該当資料なし

4. カ価

該当しない

5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

6. 製剤の各種条件下における安定性

(1) 加速試験³⁾

セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」

包装形態：PTP包装＋紙箱（最終包装品）

試験条件：40±2℃，75±5%RH

試験項目（規格）	開始時	1ヵ月後	3ヵ月後	6ヵ月後
性状（白色・割線入り・円形の素錠）	適合	適合	適合	適合
確認試験（紫外吸収スペクトル）	適合	—	—	適合
純度試験（類縁物質：個々および合計）	適合	適合	適合	適合
製剤均一性* ¹ （含量均一性試験：≤15%）	適合	—	—	適合
溶出試験* ² （%）（60分間の溶出≥80%）	90～95	91～96	92～97	93～98
定量試験（%：平均値）（95.0～105.0%）	99.6	99.6	99.2	99.1

3Lot（3回/Lot）で実施。*¹：n=10/Lot *²：n=6/Lot

セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」

包装形態：バラ包装

試験条件：40±2℃，75±5%RH

試験項目（規格）	開始時	1ヵ月後	3ヵ月後	6ヵ月後
性状（白色・割線入り・円形の素錠）	適合	適合	適合	適合
確認試験（紫外吸収スペクトル）	適合	—	—	適合
純度試験（類縁物質：個々および合計）	適合	適合	適合	適合
製剤均一性* ¹ （含量均一性試験：≤15%）	適合	—	—	適合
溶出試験* ² （%）（60分間の溶出≥80%）	90～95	90～94	90～94	90～96
定量試験（%：平均値）（95.0～105.0%）	99.6	99.6	99.5	98.8

3Lot（3回/Lot）で実施。*¹：n=10/Lot *²：n=6/Lot

セレコキシブ錠200mg「フェルゼン」

包装形態： PTP 包装＋紙箱（最終包装品）

試験条件： 40±2℃, 75±5%RH

試験項目（規格）	開始時	1ヵ月後	3ヵ月後	6ヵ月後
性状（白色・割線入り・円形の素錠）	適合	適合	適合	適合
確認試験（紫外吸収スペクトル）	適合	—	—	適合
純度試験（類縁物質：個々および合計）	適合	適合	適合	適合
製剤均一性* ¹ （含量均一性試験：≤15%）	適合	—	—	適合
溶出試験* ² （%）（60分間の溶出≥80%）	87～92	88～93	89～93	89～93
定量試験（%：平均値）（95.0～105.0%）	99.3	99.5	99.3	99.3

3Lot（3回/Lot）で実施。 *1：n=10/Lot *2：n=6/Lot

(2) 無包装状態における安定性試験⁴⁾

※本項の情報は、承認外事項に該当します。

セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」

<規格> 性状：白色・円形の素錠（割線入り）

溶出性：60分間の溶出率≥80%

定量法：表示量の95.0%～105.0%

純度試験、硬度*：（参考試験のため、設定せず） *：参考値：20N以上

【温度】試験条件：40±2℃・75±5%RH、褐色ガラス瓶（密栓）、3ヵ月間

試験項目		開始時	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
性状		適合	適合	適合	適合
溶出性（%）		88～93	88～91	90～92	86～90
※下段：平均値		90	89	91	89
定量法（%）		99.4	98.7	98.8	98.9
純度試験 （類縁物質：%）	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.05
硬度（N）		67	73	73	74

【湿度】試験条件：25±2℃・75±5%RH、シャーレ・開放、3ヵ月間

試験項目		開始時	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
性状		適合	適合	適合	適合
溶出性（%）		88～93	90～92	89～92	89～91
※下段：平均値		90	91	91	91
定量法（%）		99.4	99.3	98.7	99.3
純度試験 （類縁物質：%）	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.05
硬度（N）		67	63	65	61

【光】試験条件： 2500lx、25±2℃・45±5%RH シャーレ・開放

試験項目		開始時	30万lx・hr	60万lx・hr	120万lx・hr
性状		適合	適合	適合	適合
溶出性 (%)		88~93	89~92	89~92	89~91
※下段：平均値		90	90	90	90
定量法 (%)		99.4	98.3	99.1	98.4
純度試験 (類縁物質：%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.05	0.04
硬度 (N)		67	68	66	69

セレコキシブ錠200mg「フェルゼン」

<規格> 性状： 白色・楕円形の素錠（割線入り）

溶出性： 60分間の溶出率≥80%

定量法： 表示量の95.0%~105.0%

純度試験、硬度*：（参考試験のため、設定せず） *：参考値：20N

【温度】試験条件： 40±2℃・75±5%RH、褐色ガラス瓶（密栓）、3ヵ月間

試験項目		開始時	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
性状		適合	適合	適合	適合
溶出性 (%)		89~91	89~90	89~91	88~88
※下段：平均値		90	90	90	88
定量法 (%)		99.0	98.6	98.9	98.9
純度試験 (類縁物質：%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.05
硬度 (N)		98	98	103	100

【湿度】試験条件： 25±2℃・75±5%RH、シャーレ・開放、3ヵ月間

試験項目		開始時	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月
性状		適合	適合	適合	適合
溶出性 (%)		88~93	89~91	90~92	88~90
※下段：平均値		90	90	91	89
定量法 (%)		99.4	98.0	98.9	98.5
純度試験 (類縁物質：%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.05
硬度 (N)		67	90	89	93

【光】試験条件： 2500lx、25±2℃・45±5%RH シャーレ・開放

試験項目		開始時	30万lx・hr	60万lx・hr	120万lx・hr
性状		適合	適合	適合	適合
溶出性 (%)		88~93	88~91	88~90	89~90
※下段：平均値		90	90	89	90
定量法 (%)		99.4	98.3	99.2	98.4
純度試験 (類縁物質：%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.04
硬度 (N)		67	92	92	96

(3) 分割（半割）後の安定性試験⁵⁾

※本項の情報は、承認外事項に該当します。

セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」

<規格> 性 状 : 白色の素錠（分割錠）
 製剤均一性 : 判定値 ≤ 15%
 溶 出 性 : 60 分間の溶出率 ≥ 80%
 定 量 法 : 表示量の 95.0% ~ 105.0%
 純度試験 : （参考試験のため、設定せず）

保存条件 1 : 25 ± 2°C、60 ± 5%RH シャーレ・開放 3 ヶ月

試験項目		開始時	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性 状*		適 合	適 合	適 合	適 合
製剤均一性 (%)		2.4	—	—	—
溶出性 (%)		94~97	95~97	94~96	93~95
定量法 (%)		99.6	99.5	99.2	99.7
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.03	0.03	0.03	0.03
	総量	0.05	0.05	0.05	0.05

* : 適合 = 白色の素錠（分割錠）

保存条件 2 : 2500lx、25 ± 2°C、45 ± 5%RH シャーレ・開放 120 万 lx・hr

試験項目		開始時	30 万 lx/hr	60 万 lx/hr	120 万 lx/hr
性 状*		適 合	適 合	適 合	適 合
製剤均一性 (%)		2.4	—	—	—
溶出性 (%)		94~97	93~99	94~98	93~97
定量法 (%)		99.6	100.4	99.6	100.2
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.03	0.03	0.02	0.03
	総量	0.05	0.05	0.05	0.05

* : 適合 = 白色の素錠（分割錠）

セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」

<規格> 性 状 : 白色の素錠 (分割錠)
 製剤均一性 : 判定値 ≤ 15%
 溶 出 性 : 60 分間の溶出率 ≥ 80%
 定 量 法 : 表示量の 95.0% ~ 105.0%
 純度試験 : (参考試験のため、設定せず)

条件 1 : 25 ± 2°C、60 ± 5%RH シャーレ・開放 3 ヶ月

試験項目		開始時	1 ヶ月	2 ヶ月	3 ヶ月
性 状*		適 合	適 合	適 合	適 合
製剤均一性 (%)		1.7	—	—	—
溶出性 (%)		93~95	91~94	93~94	92~94
定量法 (%)		99.0	98.7	98.3	98.4
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.04

* : 適合 = 白色の素錠 (分割錠)

条件 2 : 2500lx、25 ± 2°C、45 ± 5%RH シャーレ・開放 120 万 lx・hr

試験項目		開始時	30 万 lx/hr	60 万 lx/hr	120 万 lx/hr
性 状*		適 合	適 合	適 合	適 合
製剤均一性 (%)		1.7	—	—	—
溶出性 (%)		93~95	92~93	93~95	92~95
定量法 (%)		99.0	98.3	98.2	98.6
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.04

* : 適合 = 白色の素錠 (分割錠)

7. 調製法及び溶解後の安定性

該当しない

8. 他剤との配合変化 (物理化学的変化)

該当資料なし


9. 溶出性⁶⁾

(1) 溶出挙動における類似性


セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」およびセレコキシブ錠200mg「フェルゼン」と、標準製剤について、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（平成24年2月29日 薬食審査発0229第10号）」に従い溶出試験を実施した結果、いずれの試験条件においてもガイドラインの判定基準に適合し、両製剤の溶出挙動は類似していることが確認された。

セレコキシブ錠100mg「フェルゼン」


【pH1.2, 50rpm】




【pH4.0, 50rpm】



【pH6.8, 50rpm】




【水, 50rpm】




【pH1.2+PS0.5%, 50rpm】

※PS0.5%：ポリソルベート 0.5% (w/v)




【pH4.0+PS0.5%, 50rpm】




【pH6.8+PS0.5%, 50rpm】

※PS0.5%：ポリソルベート 0.5% (w/v)




【pH1.2+PS0.5%, 100rpm】




セレコキシブ錠200mg「フェルゼン」


【pH1.2, 50rpm】




【pH4.0, 50rpm】



【pH6.8, 50rpm】




【水, 50rpm】




【pH1.2+PS0.5%, 50rpm】

※PS0.5%：ポリソルベート 0.5% (w/v)




【pH4.0+PS0.5%, 50rpm】




【pH6.8+PS0.5%, 50rpm】

※PS0.5%：ポリソルベート 0.5% (w/v)



【pH1.2+PS0.5%, 100rpm】



10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装, 外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当資料なし

(2) 包装

セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」 PTP : 100 錠 (10 錠×10) 、
バラ : 500 錠

セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」 PTP : 100 錠 (10 錠×10)

(3) 予備容量

該当資料なし

(4) 容器の材質

セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」

PTP 包装 ポリ塩化ビニルフィルム、アルミニウム箔

バラ包装 ボトル : ポリエチレン、キャップ : ポリプロピレン

セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」

PTP 包装 ポリ塩化ビニルフィルム、アルミニウム箔

11. 別途提供される資材類

該当資料なし

12. その他

該当資料なし

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

- 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛
関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎
- 手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛

2. 効能又は効果に関連する注意

設定されていない

3. 用法及び用量

(1) 用法及び用量の解説

<関節リウマチ>

通常、成人にはセレコキシブとして1回100～200mgを1日2回、朝・夕食後に経口投与する。

<変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎>

通常、成人にはセレコキシブとして1回100mgを1日2回、朝・夕食後に経口投与する。

<手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛>

通常、成人にはセレコキシブとして初回のみ400mg、2回目以降は1回200mgとして1日2回経口投与する。なお、投与間隔は6時間以上あけること。

頓用の場合は、初回のみ400mg、必要に応じて以降は200mgを6時間以上あけて経口投与する。ただし、1日2回までとする。

(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

4. 用法及び用量に関連する注意

7. 用法又は用量に関連する使用上の注意

- 7.1 慢性疾患（関節リウマチ、変形性関節症等）に対する使用において、本剤の投与開始後2～4週間を経過しても治療効果に改善が認められない場合は、他の治療法の選択について考慮すること。
- 7.2 本剤の1年を超える長期投与時の安全性は確立されておらず、外国において、本剤の長期投与により、心筋梗塞、脳卒中等の重篤で場合によっては致命的な心血管系血栓塞栓性事象の発現を増加させるとの報告がある。[1.参照]
- 7.3 他の消炎・鎮痛剤（心血管系疾患予防の目的で使用するアスピリンを除く）との併用は避けることが望ましい。

5. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当しない

(2) 臨床薬理試験

該当資料なし

(3) 用量反応探索試験

該当資料なし

(4) 検証的試験

1) 有効性検証試験

該当資料なし

2) 安全性試験

該当資料なし

(5) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査（一般使用成績調査，特定使用成績調査，使用成績比較調査）， 製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当しない

(7) その他

長期予防投与試験（プラセボ比較大腸ポリープ再発予防試験）

外国において、セレコキシブの大腸ポリープ再発予防注）（本剤の効能又は効果ではない）の検討を目的とする2試験が実施され、このうちAPC試験（散発性大腸腺腫再発予防試験）では、3年間の治療期間中にプラセボと比較し、セレコキシブ投与での複合評価項目（心血管事象による死亡、心筋梗塞又は脳卒中）の発現率に用量相関的な増加が認められた。複合評価項目のプラセボに対するセレコキシブの相対リスクは400mg 1日2回投与で3.4（95%CI：1.4-8.5）、200mg 1日2回投与で2.8（95%CI：1.1-7.2）であった。

3年間の複合評価項目の累積発現率では、プラセボでは0.9%（6/679）、セレコキシブ400mg 1日2回投与で3.0%（20/671）、200mg 1日2回投与で2.5%（17/685）であった。一方、PreSAP試験（大腸腺腫性ポリープ再発予防試験）では、複合評価項目についてプラセボと比較した相対リスクは400mg 1日1回投与で1.2（95%CI：0.6-2.4）で有意なリスクの増大は認められなかった。3年間の複合評価項目の累積発現率では、プラセボでは1.9%（12/628）、セレコキシブ400mg 1日1回投与で2.3%（21/933）であった⁷⁻⁹⁾（外国人データ）。

注）本剤の承認された用法及び用量は 関節リウマチ：100～200mgを1日2回、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎：100mgを1日2回、手術後、外傷後、抜歯後の消炎・鎮痛：初回のみ400mg、2回目以降は1回200mgとして1日2回経口投与する。なお、投与間隔は6時間以上あけること。頓用の場合は、初回のみ400mg、必要に応じて以降は200mgを6時間以上あけて経口投与する。ただし、1日2回までとする。

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群

ロキソプロフェンナトリウム、ジクロフェナクナトリウム、ザルトプロフェン、エトドラク、メロキシカム、ロルノキシカムなどの非ステロイド性消炎・鎮痛剤

注意：関連のある化合物の効能・効果等は、最新の電子添文を参照すること。

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

セレコキシブは、シクロオキシゲナーゼ（COX）に対する阻害活性を検討するためのヒト遺伝子組換え酵素を用いた実験及びCOX-1、COX-2をそれぞれ発現したヒト由来細胞を用いた実験において、COX-2に対して選択的な阻害作用を示した^{1,2)}（in vitro試験）。セレコキシブは、炎症局所に誘導されるCOX-2を選択的に阻害し、COX-2由来のプロスタグランジン類の合成を抑制することにより、消炎・鎮痛作用を示すと考えられる。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

1) 抗炎症及び鎮痛作用

セレコキシブは、慢性炎症モデルであるラットのアジュバント関節炎モデルにおいて、ロキソプロフェン及びインドメタシンと同程度の抗炎症及び鎮痛作用を示した¹⁰⁾。

2) 消化管に対する作用

セレコキシブは、ラットに対して胃及び小腸粘膜障害作用を示さなかった。一方、インドメタシン、ロキソプロフェン、ジクロフェナク及びナブロキセンは用量依存的に胃及び小腸粘膜障害を惹起した^{2,11)}。

3) 血小板凝集に対する作用

セレコキシブは、ヒト末梢血血小板においてアラキドン酸惹起血小板凝集を抑制しなかった。一方、ロキソプロフェン、インドメタシン、ジクロフェナク及びイブプロフェンは濃度依存的に血小板凝集を抑制した²⁾（in vitro試験）。

4) ニューキノロン系抗菌薬との併用

一部のニューキノロン系抗菌薬は、ある種の非ステロイド性消炎・鎮痛剤を併用することで、まれに痙攣を誘発することが知られている¹²⁾。セレコキシブとエノキサシン等のニューキノロン系抗菌薬をマウスに併用投与しても、痙攣は誘発されなかった¹³⁾。

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 臨床試験で確認された血中濃度


生物学的同等性試験¹⁴⁾

セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」

健康成人男性にセレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」とセレコックス錠 100mg のそれぞれ 1 錠 (セレコキシブとして 100mg) を、絶食時単回経口投与して血漿中セレコキシブ濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された (クロスオーバー法)。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC(0→48) (ng·hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T1/2 (hr)
セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」	4305.23 ± 1298.08	686.41 ± 255.83	2.3 ± 1.1	6.7 ± 2.4
セレコックス錠 100mg	4306.24 ± 1272.53	728.18 ± 255.65	2.1 ± 1.0	6.0 ± 1.9

(Mean ± S.D., n = 44)




血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」

健康成人男性にセレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」とセレコックス錠 200mg のそれぞれ 1 錠 (セレコキシブとして 200mg) を、絶食時単回経口投与して血漿中セレコキシブ濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log(0.80) \sim \log(1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された (クロスオーバー法)。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC(0→48) (ng・hr/mL)	Cmax (ng/mL)	Tmax (hr)	T1/2 (hr)
セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」	9712.10±2335.21	1247.41±430.53	2.2±1.0	7.8±2.2
セレコックス錠 200mg	9335.50±2191.89	1217.70±403.79	2.8±1.3	8.5±2.9

(Mean±S.D., n = 52)



血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

併用薬の影響

1) リチウム

健康成人 24 例にセレコキシブ 200mg とリチウム 450mg を 1 日 2 回、食後 7 日間併用したとき、定常状態におけるリチウムの Cmax 及び AUC は併用によりいずれも約 1.2 倍に上昇した¹⁵⁾(外国人データ)。

2) フルコナゾール

健康成人 17 例にフルコナゾール 200mg を 1 日 1 回、7 日間投与した後に、セレコキシブ 200mg を空腹下单回併用投与したとき、セレコキシブの Cmax 及び AUC は併用によりそれぞれ約 1.7 倍及び約 2.3 倍に上昇した^{16,17)}(外国人データ)。

3) フルバスタチン

健康成人 15 例にセレコキシブ 200mg とフルバスタチン 20mg を 1 日 2 回、食後 7 日間併用したとき、セレコキシブの Cmax 及び AUC は併用によりいずれも約 1.3 倍に上昇した。また、健康成人 13 例にセレコキシブ 200mg とフルバスタチン 20mg を 1 日 2 回、食後 7 日間併用したとき、フルバスタチンの Cmax は併用により約 1.2 倍に上昇したが、AUC は影響を受けなかった^{18,19)}(外国人データ)。

4) ワルファリン

健康成人 12 例にワルファリンを事前投与した後に、セレコキシブ 200mg を 1 日 2 回とワルファリン 1~5mg を 1 日 1 回、7 日間併用したとき、セレコキシブはワルファリンの血漿中濃度及びプロトロンビン時間に影響を及ぼさなかった。しかしながら、海外で特に高齢者において、セレコキシブとワルファリンを併用している患者に、プロトロンビン時間の延長を伴う重篤で場合によっては致命的な出血が報告されている²⁰⁾(外国人データ)。

5) パロキセチン

健康成人 18 例にパロキセチン 20mg を 1 日 1 回、食後 7 日間投与した後に、セレコキシブ 200mg を空腹下单回併用投与したとき、セレコキシブの Cmax は併用により約 0.7 倍に低下したが、AUC は影響を受けなかった^{16,21)}。また、健康成人 18 例にセレコキシブ 200mg を 1 日 2 回、食後 7 日間投与した後に、パロキセチン 20mg を空腹下单回併用投与したとき、パロキセチンの Cmax 及び AUC は併用によりそれぞれ約 1.5 倍及び約 1.8 倍に上昇した^{19,22)} (外国人データ)。

6) デキストロメトルフアン

健康成人 14 例にセレコキシブ 200mg とデキストロメトルフアン 30mg を 1 日 2 回、食後 7 日間併用したとき、デキストロメトルフアンの Cmax 及び AUC は併用によりそれぞれ約 2.4 倍及び約 2.6 倍に上昇した^{19,23)} (外国人データ)。

7) 制酸剤

健康成人 24 例にセレコキシブ 200mg と制酸剤 (アルミニウム・マグネシウム含有製剤) を空腹下单回併用投与したとき、セレコキシブの Cmax は併用により約 0.6 倍に低下したが、AUC は影響を受けなかった^{24,25)} (外国人データ)。

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」 : 0.1165 ± 0.0394 (hr⁻¹)

セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」 : 0.0964 ± 0.0282 (hr⁻¹)

(4) クリアランス

該当資料なし

(5) 分布容積

該当資料なし

(6) その他

該当資料なし

3. 母集団 (ポピュレーション) 解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸 収

該当資料なし

5. 分 布

(1) 血液 - 脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液 - 胎盤関門通過性

シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。

<参考>

妊娠末期のマウス²⁶⁾及びヒツジ²⁷⁾への投与において、胎児の動脈管収縮が報告されている。培養細胞を用いた染色体異常試験において、細胞毒性が認められる濃度で染色体の数的異常（核内倍加細胞の増加）が、生殖発生毒性試験で着床後死亡数や死産の増加、横隔膜ヘルニア、胎児体重減少等が認められている。またラットにおいて本剤が胎児に移行することが報告されている。

(3) 乳汁への移行性

ヒト母乳中への移行が報告されている^{28, 29)}。

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

(6) 血漿蛋白結合率

該当資料なし

6. 代 謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

In vitro³⁰⁾及び in vivo¹⁶⁾試験の結果から、セレコキシブは主として薬物代謝酵素 CYP2C9 を介して代謝されることが明らかとなっている。

CYP2C9 には遺伝多型が存在し、Ile³⁵⁹→Leu³⁵⁹のアミノ酸置換により薬剤によっては代謝速度が低下する場合がある。日本人 218 例を対象とした CYP2C9 の研究では、Ile³⁵⁹→Leu³⁵⁹のホモ接合体（CYP2C9*3/*3）は存在しなかったが、Leu³⁵⁹のヘテロ接合体（CYP2C9*1/*3）は 218 例中 9 例（4.1%）存在したとの報告がある³¹⁾。

CYP2C9 の遺伝多型（CYP2C9*3）の影響として、セレコキシブを単回又は反復投与したとき、CYP2C9 のヘテロ接合体（Ile³⁵⁹→Leu³⁵⁹、CYP2C9*1/*3）を有する健康成人 15 例の AUC は野生型（CYP2C9*1/*1）の健康成人 137 例に比べて約 1.6 倍と高値を示した³²⁾。

健康成人にセレコキシブ 100mg を単回投与注したとき、CYP2C9*1/*1（4 例）と比較し、CYP2C9*3/*3（3 例）の AUC は約 3 倍高値を示し³³⁾（外国人データ）、健康成人にセレコキシブ 200 mg を 1 日 1 回注 7 日間反復投与したとき、CYP2C9*1/*1（7 例）と比較し、CYP2C9*3/*3（3 例）の Cmax は約 4 倍、AUC は約 7 倍高値を示すことが報告されている³⁴⁾（外国人データ）。

注）本剤の承認された用法及び用量は関節リウマチ：100～200mg を 1 日 2 回、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎：100mg を 1 日 2 回、手術後、外傷後、抜歯後の消炎・鎮痛：初回のみ 400mg、2 回目以降は 1 回 200mg として 1 日 2 回経口投与する。なお、投与間隔は 6 時間以上あけること。頓用の場合は、初回のみ 400mg、必要に応じて以降は 200mg を 6 時間以上あけて経口投与する。ただし、1 日 2 回までとする。

(2) 代謝に関与する酵素（CYP 等）の分子種、寄与率

本剤は、主として薬物代謝酵素 CYP2C9 で代謝される。また、本剤は CYP2D6 の基質ではないが、CYP2D6 の阻害作用を有する。

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比, 存在比率

該当資料なし

7. 排 泄

該当資料なし

8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

9. 透析等による除去率

該当資料なし

10. 特定の背景を有する患者

肝機能障害患者

肝障害患者及び健康成人にセレコキシブ 100mg を 1 日 2 回、食後 5 日間反復投与したとき、軽度肝障害患者 (Child-Pugh Class A : 12 例) の AUC_{0-12h} は健康成人 (12 例) に比べて約 1.3 倍に、中等度肝障害患者 (Child-Pugh Class B : 11 例) では健康成人 (11 例) に比べて約 2.7 倍に上昇した³⁵⁾ (外国人データ)。

11. その他

該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

1. 警告

外国において、シクロオキシゲナーゼ（COX）-2 選択的阻害剤等の投与により、心筋梗塞、脳卒中等の重篤で場合によっては致命的な心血管系血栓塞栓性事象のリスクを増大させる可能性があり、これらのリスクは使用期間とともに増大する可能性があるとの報告されている。[7.2、8.1、8.2、9.1.1、11.1.3、17.3.1 参照]

2. 禁忌内容とその理由

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 本剤の成分又はスルホンアミドに対し過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 アスピリン喘息（非ステロイド性消炎・鎮痛剤等による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある患者〔重症喘息発作を誘発するおそれがある。〕[9.1.6 参照]
- 2.3 消化性潰瘍のある患者〔消化性潰瘍を悪化させるおそれがある。〕[9.1.4 参照]
- 2.4 重篤な肝障害のある患者 [9.3.1 参照]
- 2.5 重篤な腎障害のある患者 [9.2.1 参照]
- 2.6 重篤な心機能不全のある患者〔プロスタグランジン合成阻害作用に基づくナトリウム・水分貯留傾向があるため心機能を悪化させるおそれがある。〕[9.1.2 参照]
- 2.7 冠動脈バイパス再建術の周術期患者 [外国において、類薬で心筋梗塞及び脳卒中の発現が増加するとの報告がある。] [9.1.1 参照]
- 2.8 妊娠末期の女性 [9.5.1 参照]

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

設定されていない。

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

「V.4. 用法及び用量に関連する注意」の項参照。

5. 重要な基本的注意とその理由

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤を使用する場合は、有効最小量を可能な限り短期間投与することに留め、長期にわたり漫然と投与しないこと。[1.参照]
- 8.2 本剤の投与により、心筋梗塞、脳卒中等の重篤で場合によっては致命的な心血管系血栓塞栓性事象が発現するおそれがあるので、観察を十分に行い、これらの徴候及び症状の発現には十分に注意すること。[1、9.1.1 参照]
- 8.3 本剤には血小板に対する作用がないので、心血管系疾患予防の目的でアスピリンの代替薬として使用しないこと。抗血小板療法を行っている患者については、本剤投与に伴い、その治療を中止してはならない。
- 8.4 国内で患者を対象に実施した臨床試験では COX-2 に対して選択性の高い本剤と選択性の低い非ステロイド性消炎・鎮痛剤による消化管の副作用発現率に差は認められなかった。特に、消化管障害発生のリスクファクターの高い患者への投与に際しては副作用の発現に十分な観察を行うこと。[18.3 参照]
- 8.5 肝不全、肝炎、AST、ALT、ビリルビン等の上昇、黄疸の発現が報告されているので、定期的に肝機能検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.5 参照]
- 8.6 急性腎障害、間質性腎炎等の重篤な腎障害の発現が報告されているので、定期的に腎機能検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.7 参照]
- 8.7 本剤の投与により、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）等の重篤で場合によっては致命的な皮膚症状が発現するおそれがあり、多くの場合、これらの事象は投与開始後 1 ヶ月以内に発現しているため、治療初期には特に注意すること。[11.1.8 参照]
- 8.8 慢性疾患（関節リウマチ、変形性関節症等）に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
 - ・定期的あるいは必要に応じて臨床検査（尿検査、血液検査、腎機能検査、肝機能検査、心電図検査及び便潜血検査等）を行うこと。

- ・消炎・鎮痛剤による治療は原因療法ではなく、対症療法であることに留意すること。また、薬物療法以外の療法も考慮すること。
- 8.9 急性疾患（手術後、外傷後並びに抜歯後の消炎・鎮痛）に対し本剤を用いる場合には、次の事項を考慮すること。
 - ・急性炎症及び疼痛の程度を考慮し、投与すること。
 - ・原則として長期投与を避けること。
 - ・原因療法があればこれを行い、本剤を漫然と投与しないこと。
 - ・初回の投与量が2回目以降と異なることに留意し、患者に対し服用方法について十分説明すること。
- 8.10 本剤で報告されている薬理作用により、感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染症の発現に十分に注意し慎重に投与すること。
- 8.11 浮動性めまい、回転性めまい、傾眠等が起こることがあるので、自動車の運転等危険を伴う作業に従事する場合には注意させること。

6. 特定の背景を有する患者に関する注意

(1) 合併症・既往歴等のある患者

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 心血管系疾患又はその既往歴のある患者（冠動脈バイパス再建術の周術期患者を除く）
[1.、2.7、8.2 参照]

9.1.2 心機能障害のある患者（重篤な心機能不全のある患者を除く）

水、ナトリウムの貯留が起こる可能性があり、心機能障害を悪化させるおそれがある。
[2.6 参照]

9.1.3 高血圧症のある患者

水、ナトリウムの貯留が起こる可能性があり、血圧を上昇させるおそれがある。

9.1.4 消化性潰瘍の既往歴のある患者

消化性潰瘍を再発させるおそれがある。 [2.3 参照]

9.1.5 非ステロイド性消炎・鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある患者で、本剤の長期投与が必要であり、かつミソプロストールによる治療が行われている患者

本剤を継続投与する場合には、十分経過を観察し、慎重に投与すること。ミソプロストールは非ステロイド性消炎・鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能又は効果としているが、ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰瘍もある。

9.1.6 気管支喘息のある患者（アスピリン喘息又はその既往歴のある患者を除く）

喘息発作を誘発するおそれがある。 [2.2 参照]

(2) 腎機能障害患者

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重篤な腎障害のある患者

投与しないこと。腎障害を悪化させるおそれがある。 [2.5 参照]

9.2.2 腎障害又はその既往歴のある患者（重篤な腎障害のある患者を除く）

腎血流量低下及び水、ナトリウムの貯留が起こる可能性があり、腎障害を悪化又は再発させるおそれがある。

(3) 肝機能障害患者

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重篤な肝障害のある患者

投与しないこと。肝障害を悪化させるおそれがある。 [2.4 参照]

9.3.2 肝障害又はその既往歴のある患者（重篤な肝障害のある患者を除く）

用量を減らすなど慎重に投与すること。血中濃度が高くなるとの報告がある。
[16.6.1 参照]

(4) 生殖能を有する者

設定されていない

(5) 妊婦

9.5 妊婦

9.5.1 妊娠末期の女性

投与しないこと。妊娠末期のマウス²⁶⁾ 及びヒツジ²⁷⁾ への投与において、胎児の動脈管収縮が報告されている。[2.8 参照]

9.5.2 妊婦（妊娠末期を除く）又は妊娠している可能性のある女性

治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。投与する際には、必要最小限にとどめ、適宜羊水量を確認するなど慎重に投与すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤（経口剤、坐剤）を妊婦に使用し、胎児の腎機能障害及び尿量減少、それに伴う羊水過少症が起きたとの報告がある。培養細胞を用いた染色体異常試験において、細胞毒性が認められる濃度で染色体の数的異常（核内倍加細胞の増加）が、生殖発生毒性試験で着床後死亡数や死産の増加、横隔膜ヘルニア、胎児体重減少等が認められている。またラットにおいて本剤が胎児に移行することが報告されている。

(6) 授乳婦

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中への移行が報告されている^{28, 29)}。

(7) 小児等

9.7 小児等

小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。

(8) 高齢者

9.8 高齢者

患者の状態を観察しながら、慎重に投与すること。一般に生理機能が低下している。

7. 相互作用

10. 相互作用

本剤は、主として薬物代謝酵素 CYP2C9 で代謝される。また、本剤は CYP2D6 の基質ではないが、CYP2D6 の阻害作用を有する。[16.4 参照]

(1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

(2) 併用注意とその理由

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ACE 阻害剤 エナラプリルマレイン酸塩 イミダプリル塩酸塩 テモカプリル塩酸塩 等 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサルタンシレキセチル バルサルタン ロサルタンカリウム 等	非ステロイド性消炎・鎮痛剤（NSAID）はアンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害剤の降圧効果を減弱させる可能性があるとの報告がある。本剤と ACE 阻害剤又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤との相互作用は明らかではないが、併用する場合は相互作用の起こる可能性を考慮すること。（なお、リシノプリルを併用した臨床試験では、顕著な血圧変化は認められなかったとの報告がある）	他の NSAID では、腎臓におけるプロスタグランジン合成阻害によると考えられている。

フロセミド チアジド系利尿剤 トリクロルメチアジド ヒドロクロロチアジド 等	患者によっては他の NSAID がフロセミド及びチアジド系利尿剤のナトリウム排泄作用を低下させることが示されている。本剤と、フロセミド又はチアジド系利尿剤との相互作用は明らかではないが、併用する場合は相互作用の起こる可能性を考慮すること。	他の NSAID では、腎臓におけるプロスタグランジン合成阻害によると考えられている。
アスピリン	本剤と低用量アスピリン（1日 325mg 以下）を併用した場合、本剤のみを服用したときに比べて消化性潰瘍・消化管出血等の発生率が高くなることが報告されている。	アスピリンの併用により NSAID の消化性潰瘍・消化管出血等を助長させると考えられている。
抗血小板薬 クロピドグレル 等	本剤と抗血小板薬を併用した場合、本剤のみを服用したときに比べて消化管出血の発生率が高くなることが報告されている。	これらの薬剤は血小板凝集抑制作用を有するため、NSAID の消化管出血を助長させると考えられている。
リチウム [16.7.1 参照]	リチウムの血漿中濃度が上昇し、リチウムの作用が増強するおそれがある。リチウムを使用中の患者に本剤の投与を開始又は中止するときには十分に患者をモニターすること。	機序は明らかではないが、腎排泄を阻害するためと考えられている。
フルコナゾール [16.7.2 参照]	本剤の血漿中濃度が上昇し、本剤の作用が増強するおそれがある。フルコナゾールを使用中の患者には本剤の投与を低用量から開始すること。	CYP2C9 による本剤の代謝を阻害すると考えられている。
フルバスタチン [16.7.3 参照]	本剤及びフルバスタチンの血漿中濃度が上昇し、本剤及びフルバスタチンの作用が増強するおそれがある。	CYP2C9 による本剤の代謝を阻害するため、また本剤と同じ CYP2C9 で代謝されるためと考えられている。
クマリン系抗凝血剤 ワルファリン [16.7.4 参照]	プロトロンビン時間が延長するおそれがある。海外で特に高齢者において、重篤で場合によっては致命的な出血が報告されている。ワルファリンを使用中の患者に本剤の投与を開始あるいは用法を変更する際には十分注意して観察すること。	CYP2C9 を介する代謝の競合阻害によると考えられている。
パロキセチン [16.7.5 参照]	本剤の血漿中濃度が低下し、パロキセチンの血漿中濃度が上昇した。本剤の作用が減弱し、パロキセチンの作用が増強するおそれがある。	CYP2D6 の阻害作用によると考えられている。
デキストロメトर्फアン [16.7.6 参照]	デキストロメトर्फァンの血漿中濃度が上昇し、デキストロメトर्फァンの作用が増強するおそれがある。	CYP2D6 の阻害作用によると考えられている。
制酸剤 アルミニウム製剤 マグネシウム製剤 等 [16.7.7 参照]	本剤の血漿中濃度が低下し、本剤の作用が減弱するおそれがある。	機序は明らかでない。

8. 副作用

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(1) 重大な副作用と初期症状

11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）

ショック、アナフィラキシー、呼吸困難、血管浮腫、血管炎、気管支痙攣等の重篤な過敏症の発現が報告されている。

11.1.2 消化性潰瘍（0.2%）、消化管出血（0.1%未満）、消化管穿孔（頻度不明）

吐血、下血（メレナ）等の症状が認められた場合は投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.3 心筋梗塞、脳卒中（いずれも頻度不明）

心筋梗塞、脳卒中等の重篤で場合によっては致命的な心血管系血栓塞栓性事象が報告されている。[1. 参照]

11.1.4 心不全、うっ血性心不全（いずれも頻度不明）

11.1.5 肝不全、肝炎（いずれも頻度不明）、肝機能障害（0.1%未満）、黄疸（頻度不明）

肝不全、肝炎、AST、ALT、ビリルビン等の上昇、黄疸の発現が報告されている。[8.5 参照]

11.1.6 再生不良性貧血、汎血球減少症、無顆粒球症（いずれも頻度不明）

再生不良性貧血、汎血球減少症、無顆粒球症、白血球減少症、血小板減少症の発現が報告されている。

11.1.7 急性腎障害、間質性腎炎（いずれも頻度不明）

急性腎障害、間質性腎炎等の重篤な腎障害の発現が報告されている。[8.6 参照]

11.1.8 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、剥脱性皮膚炎（いずれも頻度不明）

中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑、急性汎発性発疹性膿疱症、剥脱性皮膚炎等の重篤で場合によっては致命的な皮膚症状の発現が報告されているので、発疹、粘膜障害もしくは他の過敏症に関連する徴候が認められた場合は直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。[8.7 参照]

11.1.9 間質性肺炎（頻度不明）

咳嗽、呼吸困難、発熱、肺音の異常（捻髪音）等が認められた場合には、速やかに胸部 X 線、胸部 CT、血清マーカー等の検査を実施すること。間質性肺炎が疑われた場合には投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

11.2 その他の副作用

	5%以上	1~5%未満	0.1~1%未満	0.1%未満	頻度不明
全身			倦怠感、口渇、末梢性浮腫	悪寒、全身浮腫、疲労、ほてり、体重増加	インフルエンザ様疾患
精神神経系		傾眠	頭痛、浮動性めまい、味覚異常	酩酊感、体位性めまい、感覚鈍麻、意識レベルの低下	不眠症、睡眠障害、錯乱状態、不安、幻覚、筋緊張亢進、無嗅覚
肝胆道系		ALT 増加	AST 増加、γ-GTP 増加、Al-P 増加、血中ビリルビン増加、尿ウロビリノーゲン陽性		
代謝・栄養		BUN 増加	CK 増加、食欲不振、LDH 増加、尿糖陽性	糖尿病	血中カリウム増加、血中ナトリウム増加

消化器		腹痛、口内炎、下痢、便潜血陽性	悪心、鼓腸、消化不良、便秘、胃炎、口内乾燥、舌障害、嘔吐、口角びらん、腹部膨満、上腹部痛、胃不快感	胃腸障害、舌炎、口腔内痛、食道炎、口の感覚鈍麻、アフタ性口内炎、口腔粘膜水疱形成、心窩部不快感、胃腸炎	歯の脱落、口腔内潰瘍、嚥下障害、胃食道逆流性疾患、腭炎、憩室、過敏性腸症候群、痔出血、排便回数増加
泌尿器	β_2 -マイクログロブリン増加	NAG 増加、尿潜血陽性	尿蛋白陽性	多尿、尿閉、頻尿、腎機能障害	腎結石症、良性前立腺肥大症、前立腺炎、PSA 増加、血中クレアチニン増加
循環器			高血圧、潮紅、動悸	高血圧増悪、循環虚脱	不整脈、頻脈、洞性徐脈、狭心症、不安定狭心症、大動脈弁閉鎖不全症、冠動脈硬化症、心室肥大、深部静脈血栓症、血腫
呼吸器				咽頭炎、鼻出血、鼻咽頭炎	気管支炎、咳嗽、鼻炎、副鼻腔炎、呼吸困難、発声障害
皮膚		発疹	そう痒症、顔面浮腫、紅斑性皮疹、湿疹、蕁麻疹、薬疹	点状出血、斑状丘疹状皮疹、皮膚乾燥、頭部枇糠疹、多汗、皮膚炎、紅斑	斑状出血、光線過敏性反応、脱毛症、水疱性皮膚炎
感覚器			耳鳴、回転性めまい	耳痛、霧視、眼そう痒症	硝子体浮遊物、結膜出血、聴力低下
その他				背部痛、筋硬直、関節痛、四肢痛、不正子宮出血、月経障害、ウイルス感染、細菌性腸炎、頸部痛	貧血、ヘマトクリット減少、ヘモグロビン増加、真菌感染、細菌感染、ヘリコバクター感染、尿路感染、上気道感染、耳感染、帯状疱疹、丹毒、創傷感染、歯肉感染、迷路炎、アレルギー増悪、無菌性髄膜炎、筋痙縮、脂肪腫、ガングリオン、腔出血、乳房圧痛、卵巣嚢胞、閉経期症状、血中テストステロン減少、上顎炎、腱断裂、骨折、損傷

9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

10. 過量投与

設定されていない

11. 適用上の注意

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること。PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

12. その他の注意

(1) 臨床使用に基づく情報

15.1 臨床使用に基づく情報

外国におけるクロスオーバー二重盲検比較試験において、本剤非投与時に比べて本剤投与時に排卵障害の割合が増加したとの報告がある。また、他の非ステロイド性消炎・鎮痛剤を長期間投与されている女性において、一時的な不妊が認められたとの報告がある。

(2) 非臨床試験に基づく情報

設定されていない

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」参照

(2) 安全性薬理試験

該当資料なし

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし（「VIII-6. (5) 妊婦」の項参照）

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤： セレコキシブ錠 100mg 「ダイト」 劇薬、処方箋医薬品^{注)}
セレコキシブ錠 200mg 「ダイト」 劇薬、処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

有効成分： セレコキシブ : 劇薬

2. 有効期間

3年

3. 包装状態での貯法

室温保存

4. 取扱い上の注意

設定されていない

5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド : あり

くすりのしおり : あり

6. 同一成分・同効薬

同一成分薬：セレコックス錠 100mg、セレコックス錠 200mg

同効薬：ロキソプロフェンナトリウム、ジクロフェナクナトリウム、ザルトプロフェン、エトドラク、メロキシカム、ロルノキシカム、ナプロキセン、イブプロフェン等

7. 国際誕生年月日

不明

8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

販 売 名	製造販売承認年月日	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
セレコキシブ錠 100mg「フェルゼン」	2020年2月17日	30200AMX00383000	2020年6月19日	2020年6月19日
セレコキシブ錠 200mg「フェルゼン」	2020年2月17日	30200AMX00394000	2020年6月19日	2020年6月19日

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

該当しない

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード

販 売 名	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	個別医薬品コード (YJコード)	HOT (9桁) 番号	レセプト電算コー ド
セレコキシブ錠 100mg「フェルゼン」	1149037F1194	1149037F1194	127042601	622704201
セレコキシブ錠 200mg「フェルゼン」	1149037F2190	1149037F2190	127043301	622704301

14. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

XI. 文献

1. 引用文献

- 1) Penning TD et al. : J. Med. Chem. 1997 ; 40 (9) : 1347-1365
- 2) Yoshino T et al. : Arzneimittel-Forschung/Drug Res. 2005 ; 55 (7) : 394-402
- 3) 社内資料：安定性に関する資料
- 4) 社内資料：無包装状態における安定性に関する資料
- 5) 社内資料：分割後の安定性に関する資料
- 6) 社内資料：溶出試験に関する資料
- 7) Bertagnolli MM et al. : N. Engl. J. Med. 2006 ; 355 (9) : 873-884
- 8) Arber N et al. : N. Engl. J. Med. 2006 ; 355 (9) : 885-895
- 9) Solomon SD et al. : Circulation. 2006 ; 114 (10) : 1028-1035
- 10) Noguchi M et al. : Eur. J. Pharmacol. 2005 ; 513 (3) : 229-235
- 11) 消化管粘膜に対する作用（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.6.2.2)
- 12) 厚生省薬務局：医薬品副作用情報 No.98,1989
- 13) Yoshino T et al. : Eur. J. Pharmacol. 2005 ; 507 (1-3) : 69-76
- 14) 社内資料：生物学的同等性試験に関する資料
- 15) リチウムとの薬物相互作用試験(セレコックス錠:2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.6.20)
- 16) 海外健康成人・代謝及び薬物相互作用（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.2.2)
- 17) 海外健康成人・代謝及び薬物相互作用（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.6.18)
- 18) フルバスタチンとの薬物相互作用試験（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.6.27)
- 19) 薬物相互作用試験の要約（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.2.5)
- 20) Karim A et al. : J. Clin. Pharmacol. 2000 ; 40 (6) : 655-663
- 21) パロキセチンとの薬物相互作用（外国,パロキセチンの影響）（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.6.30)
- 22) パロキセチンとの相互作用試験（外国,セレコキシブの影響）（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.6.31)
- 23) デキストロメトルファンとの薬物相互作用試験（外国）（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.6.28)
- 24) 食事及び制酸剤の影響試験（外国）（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.6.25)
- 25) 食事及び制酸剤の影響試験（外国）（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.2.2)
- 26) Sakai M et al. : Mol. Hum. Reprod. 2001 ; 7 (6) : 595-602
- 27) Takahashi Y et al. : Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 2000 ; 278 (6) : R1496-R1505
- 28) Knoppert DC et al. : Pharmacotherapy. 2003 ; 23 (1) : 97-100
- 29) Hale TW et al. : J. Hum. Lact. 2004 ; 20 (4) : 397-403
- 30) Tang C et al. : J. Pharmacol. Exp. Ther. 2000 ; 293 (2) : 453-459
- 31) Nasu K et al. : Pharmacogenetics. 1997 ; 7 (5) : 405-409
- 32) CYP2C9*3 の影響（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.2.3)
- 33) Kirchheiner J et al. : Pharmacogenetics. 2003 ; 13 (8) : 473-480
- 34) Lundblad MS et al. : Clin. Pharmacol. Ther. 2006 ; 79 (3) : 287-288
- 35) 肝障害患者における薬物動態試験（外国）（セレコックス錠：2007年1月26日承認、申請資料概要 2.7.2.2)
- 36) 社内資料：粉碎後の安定性に関する資料
- 37) 社内資料：崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性試験に関する資料

2. その他の参考文献

該当資料なし

XII. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当資料なし

2. 海外における臨床支援情報

(1) 妊婦への投与に関する海外情報

該当資料なし

(2) 小児等への投与に関する海外情報

該当資料なし

XIII. 備考

1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

本項の情報に関する注意：本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可否を示すものではない。

掲載根拠：「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その3)」
令和元年9月6日付 厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課事務連絡

(1) 粉砕

セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」

1) 保存条件

- ・温度 40±2℃、75±5%RH・ガラス瓶（密栓） 90日間
- ・湿度 25±2℃、75±5%RH、シャーレ・開放 90日間
- ・光 2500lx、25±2℃、45±5%RH、シャーレ・開放 ～120万lx・hr

2) 試験項目および規格

- ・性状：（白色の粉末）
- ・定量法：表示量の95.0%～105.0%
- ・純度試験：（参考試験のため、設定せず）

【温度条件での結果】

試験項目		開始時	7日	14日	30日	90日
性状*		適合	適合	適合	適合	適合
定量法 (%)		98.6	98.3	99.1	99.0	99.2
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05

*：適合＝白色の粉末

【湿度条件での結果】

試験項目		開始時	7日	14日	30日	90日
性状*		適合	適合	適合	適合	適合
定量法 (%)		98.6	97.2	98.4	99.0	98.3
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

*：適合＝白色の粉末

【光条件での結果】

試験項目		開始時	30万 lx/hr	60万 lx/hr	120万 lx/hr
性状*		適合	適合	適合	適合
定量法 (%)		98.6	97.9	98.1	98.8
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.04

* : 適合 = 白色の粉末

セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」

1) 保存条件

- ・温度 40±2℃、75±5%RH・ガラス瓶（密栓） 90日間
- ・湿度 25±2℃、75±5%RH、シャーレ・開放 90日間
- ・光 2500lx、25±2℃、45±5%RH、シャーレ・開放 ~120万 lx・hr

2) 試験項目および規格

- ・性状：（白色の粉末）
- ・定量法：表示量の95.0%~105.0%
- ・純度試験：（参考試験のため、設定せず）

【温度条件での結果】

試験項目		開始時	7日	14日	30日	90日
性状*		適合	適合	適合	適合	適合
定量法 (%)		98.6	99.3	98.4	99.0	99.0
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05

* : 適合 = 白色の粉末

【湿度条件での結果】

試験項目		開始時	7日	14日	30日	90日
性状*		適合	適合	適合	適合	適合
定量法 (%)		98.6	97.5	97.7	97.4	97.6
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05

* : 適合 = 白色の粉末

【光条件での結果】

試験項目		開始時	30 万 lx/hr	60 万 lx/hr	120 万 lx/hr
性状*		適合	適合	適合	適合
定量法 (%)		98.6	98.3	98.5	98.2
純度試験 (類縁物質:%)	個々	0.02	0.02	0.02	0.02
	総量	0.04	0.04	0.04	0.04

* : 適合=白色の粉末

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

1) 崩壊懸濁試験

「内服薬経管投与ハンドブック第3版」(株じほう)「1.崩壊懸濁試験 1)錠剤・カプセル剤」に準じ、ディスペンサー内に本品 1 錠および 55℃の温湯 20mL を入れ、5 分間自然放置した後、ディスペンサーを 90 度で 15 往復横転させ、崩壊・懸濁の状態を観察した。5 分後に崩壊しない場合は、更に 5 分間放置後、同様な操作を行い、崩壊・懸濁の状態を観察した。

2) 通過性試験

「内服薬経管投与ハンドブック第3版」(株じほう)「2.通過性試験」に準じ、崩壊懸濁法で得られた懸濁液を経管チューブの注入端より 2~3mL/秒の速度で注入した。チューブはベッド上の患者様を想定して、体内挿入端から 3 分の 2 を水平にし、他端(注入端)を 30cm の高さにセットした。経管チューブ(8 フレンチ)による通過性を観察した。懸濁液を注入した後に 20mL の水を同じ注射器で吸い取り、注入してチューブ内を洗うとき、注入器内・チューブ内に薬が残存していなければ通過性に問題なしとした。

3. 判定方法

「内服薬経管投与ハンドブック第3版」(株じほう)の経管投与適否判定基準により判定した。

<適否> 経管投与の適否を表す。

適 1 : 10 分以内に崩壊・懸濁し、8Fr.経鼻チューブを通過

適 2 : 錠剤のコーティングを破壊、あるいはカプセルを開封すれば、10 分以内に崩壊・懸濁し、8Fr.経鼻チューブを通過

適 3 : 投与直前にコーティング破壊を行えば使用可能

不適 : 経管投与に適さない

4. 試験結果 :

セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」

崩壊懸濁試験	10 分時点で完全に崩壊しなかった。乳棒で 15 回叩き粉碎して再度試験を行ったところ、5 分時点で完全に崩壊し、良好な懸濁状態を示した。
通過性試験	懸濁液は 8Fr.のチューブを通過し、チューブ通過後に薬剤の残存はなかった。
適否判定	[適 2] 錠剤のコーティングを破壊、あるいはカプセルを開封すれば 10 分以内に崩壊・懸濁し、8Fr.チューブを通過する。

セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」

崩壊懸濁試験	10分時点で完全に崩壊しなかった。乳棒で15回叩き粉碎して再度試験を行ったところ、5分時点で完全に崩壊し、良好な懸濁状態を示した。
通過性試験	懸濁液は8Fr.のチューブを通過し、チューブ通過後に薬剤の残存はなかった。
適否判定	[適2] 錠剤のコーティングを破壊、あるいはカプセルを開封すれば10分以内に崩壊・懸濁し、8Fr.チューブを通過する。

(3) 落下試験

自動分包機によるセレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」 およびセレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」の一化化に関して、本剤の充填適性を評価した。

1) 試験製剤

- ・セレコキシブ錠 100mg 「フェルゼン」 (Lot 番号：1CEL104901)
※錠剤の大きさ等 直径：8.1mm 厚さ：2.6mm 質量：180mg
- ・セレコキシブ錠 200mg 「フェルゼン」 (Lot 番号：1CEL204901)
※錠剤の大きさ等 長径：13.1mm 短径：6.6mm 厚さ：5.2mm 質量：360mg

2) 使用機器

- ・自動分包機① Eser130J4 (株式会社タカゾノ)
カセット：マルチカセット
- ・自動分包機② Eser HP-J128HS-GP (株式会社タカゾノ)
カセット：Mカセット

3) 試験方法等

- ・試験方法
：マルチカセットまたはMカセットに試験製剤を入れ、自動分包機の最上段にカセットを装着して分包作業を行い、充填精度、錠剤外観、カセット内の状態などを確認した。
※最上段からの落差 自動分包機①：約123cm 自動分包機②：約109cm
- ・充填条件 (充填数、包装数)：1錠/包×50包、3錠/包×50包
- ・評価項目

No.	評価項目
1	分包充填精度の確認 (1錠/包、3錠/包)
2	カセット内の錠剤外観確認 (欠け、割れ など)
3	分包内の錠剤外観確認 (欠け、割れ など)
4	カセット内の汚れ、微粉末などの確認

4) 試験結果

自動分包機①、②とも、分包時における充填精度および充填された試験製剤の外観品質に問題は認められなかった。

セレキシブ錠 100mg 「フェルゼン」

評価項目	分包機① (マルチカセット)		分包機② (Mカセット)	
	1錠/包	3錠/包	1錠/包	3錠/包
1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

セレキシブ錠 200mg 「フェルゼン」

評価項目	分包機① (マルチカセット)		分包機② (Mカセット)	
	1錠/包	3錠/包	1錠/包	3錠/包
1	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
3	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

2. その他の関連資料

(1) 患者向け説明用資材

該当資料なし

(2) GS1 コード

販売名	包装	GS1 コード	
		販売包装単位コード	調剤包装単位コード
セレキシブ錠 100mg 「フェルゼン」	100錠 PTP (10錠×10)	(01)04987923105103	(01)14987923103106
	500錠 (バラ)	(01)04987923105158	(01)14987923103151
セレキシブ錠 200mg 「フェルゼン」	100錠 PTP (10錠×10)	(01)04987923105202	(01)14987923103205