

デュタステリドカプセル 0.5mgAV「BMD」 を服用される患者様へ

このお薬は、前立腺肥大症の治療薬です。

- 前立腺の増殖・肥大の要因である男性ホルモンの働きを抑える作用があり、肥大した前立腺を縮小させる効果が期待できます。




本剤を服用する前に・・・

以下に該当する場合は、医師・薬剤師にお伝えください。

- くすりでアレルギー（発疹、かゆみなど）を経験したことがある。
- AGA（男性型脱毛症）の治療目的で、または それ以外でも薬やサプリメントなどをのんでいる。
- 肝臓の病気を患っている。

服用方法など

- 1日1回1カプセルを服用します。
- 内部の薬液が口やのどの粘膜を刺激する可能性があるため、カプセルを噛んだり開けたりせず、水やぬるま湯で服用してください。
- 服用を忘れた場合、気づいたときに1回分を服用してください。次の服用時刻が近い場合は忘れた分をとばして、次の1回分のみを服用してください。決して、一度に2回分を服用しないでください。
- 服用を継続することにより肥大した前立腺は徐々に小さくなり、症状（排尿障害）も改善します。自己判断で中止したり、服用量を変えたりせず、指示を守って治療を続けましょう。



(メモ)

薬局名/病・医院名

服用中にご注意いただくこと

副作用 など

以下の症状があらわれたり、からだの様子がいつもと違うと感じた場合には、直ちに医師、薬剤師に相談してください。

全身倦怠(だるい)、
食欲不振、嘔気・嘔吐、
白目や皮膚が黄色い



性欲減退、勃起不全、
乳房の腫れ・痛み・不快感



他に少しでも気になることがあれば、遠慮せずに相談しましょう。

保管・取り扱いについて

～ 本剤は、中に液状の薬剤(薬液)を含む「軟カプセル剤」です ～

・カプセルを傷つけないよう(=薬液に触れないよう)ご注意ください。特に、女性やお子様が悪液に触れてしまった場合には、直ちに石鹸を使い、洗い流してください。

・高温・多湿の場所では、カプセルの軟化・変形、破損(=薬液モレ)などが起こる可能性があります。

PTPシートからは出さず室温(1～30℃)で保管し、服用直前にシートから出してください。直射日光などの強い光も避けましょう。

● 高温になりやすい場所

暖房器具のそば、クルマの中 など



● 多湿になりやすい場所

洗面所(浴室付近)、台所 など



高温、光、
多湿・水蒸気
を避ける!



その他、ご留意いただくこと

● PSA(前立腺特異抗原)検査を受ける際は、本剤を服用していることをご担当の医師に必ず伝えてください。

服用を開始6ヵ月後から、PSA検査での値は約50%低く出ますので、その影響を考慮してもらう必要があります。

こちらにメモしておきましょう

服用開始日

服用前のPSA値

20__年__月__日 _____ng/mL

● 上記以外で医療機関を受診したり、薬局で薬を購入する場合などでも、医師・薬剤師に服用している薬をお話することは大切です。

<参考> PSA検査

前立腺肥大症(良性腫瘍)と前立腺癌(悪性腫瘍)の症状はよく似ているため、検査で両者を鑑別する必要があります。その検査の1つとして、血液中のPSA測定があります。(高値の場合には、前立腺癌が疑われます)

● もし本剤が残った場合は破棄してください。決して、他の人(親族、知人など)に渡さないでください。