

その他にも、何か気になることや不安なことがあれば、積極的に医師または薬剤師にご連絡・相談してください。

メモ

薬局名／病・医院名

プレガバリンOD錠「フェルゼン」 を服用される患者様とご家族の方へ

プレガバリンOD錠「フェルゼン」は
神経の痛みを和らげるお薬です

□ 25mg



□ 75mg



□ 150mg



※写真は実際の大きさと異なります。

●本剤を服用する前に●


以下に該当する場合は、必ず医師または薬剤師にお伝えください。

- 薬によるかゆみ、発疹などのアレルギー症状、あるいは血管浮腫などの過敏症を経験したことがある。
- 腎機能がよくない、透析を受けている。
- 心臓、血管に関する病気がある（あった）。
- 妊娠している〔可能性がある〕。授乳している。
- 他の薬やサプリメントを服用している（薬局、ドラッグストアで買ったものを含む）。

●服用方法と留意点●

- この薬（OD錠）は水なしでも服用できます。唾液で溶かして一緒にのみ込んでください。水での服用も可能です（もし苦みを感じる場合には、水で速やかにのみむことをお勧めします）。
- 服用を開始した後に、1週間以上かけて徐々に用量を増やします。
- 期待する効果を得るため、痛みがない（または弱い）時があっても一定期間は服用を継続してください。
- 治療に時間がかかることもあります、痛みが軽減することで服用量を減らせる、あるいは服薬が不要になることもあります。

服薬計画（イメージ）



あなたの年齢、症状等が考慮され、服用量や回数が決まります。

- 服用を忘れた時でも、絶対に2回分を一度にのみまないでください。（気がついた時に1回分を服用します。ただし、次の服用時刻が近い場合は1回分をとばし、次の分を予定どおりのんでください。）
- 誤って多くのんでしまった場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

●服用開始後の注意点●

- 服用中に、次のような副作用が現れることがあります。その他も含め、気になる症状があれば、ただちに医師・薬剤師に相談して下さい。

めまい、眠気、意識消失

特に、ご高齢の方は転倒して骨折やケガをする危険性がありますので、十分に注意してください。

また、事故の危険性がありますので、自動車の運転や危険を伴う機械の操作をしないでください。

体重の増加、浮腫（むくみ）

体重が増えたり、浮腫がみられることがありますので、気になる徴候を感じた場合には、医師・薬剤師にご相談ください。

眼の異常、障害

視力低下、目のかすみ、二重に見えるなどの異常を感じた場合は医師・薬剤師にご相談ください。

- アルコールはこの薬に影響しますので、控えめにしてください。
- 服用を急に中止すると吐き気、下痢、頭痛、不眠、不安などが現れるおそれがあります。

※服薬を休止/中止する時は、1週間以上かけて徐々に服用量を減らしていきます。必ず医師と相談しながら行ってください。

指示どおりに服用することが非常に重要です。
（ご自身の判断で服用量を変えたり中止すると症状悪化や副作用発現のおそれがあります）

- （女性の場合）服用中に妊娠された場合には、すぐに医師・薬剤師にご相談ください。授乳中の方は、授乳を避けてください。