

クロピドグレル錠「TCK」を 服用される患者様へ



このお薬を正しく服用するため、飲む前に必ずお読みください。

- このお薬は、血のかたまり（血栓）ができるのを防ぐお薬です。
- 必ず医師または薬剤師の指示通りに服用してください。
- この薬は、体調が良くなったと自己判断し、使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化したり、再発することがあります。

裏面の注意事項も必ず守ってください。

飲み始めてから 2 ヶ月までの方へ

このお薬は、特に飲み始めの 2 ヶ月以内に肝障害や血液障害などの重い副作用がごくまれに起こることが知られています。

定期的に医師の診察を受け、血液検査など、医師の指示に従ってください。

次のような症状があらわれた場合には、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

- ぶつぶつがでる
- 意識が低下する(うとうとする)
- あざができる(紫色・赤色)
- 気分が悪い(吐き気がする)
- 皮膚や白眼が黄色くなる
- 強い疲労感を感じる
- 食欲がなくなる
- 鼻や歯ぐきから出血する
- 尿が茶色っぽくなる、
血が混じる
- かぜのような症状
(熱が出る、さむけがする、のどが痛む)

注意

このお薬を服用中は、血がかたまりにくくなったり、出血しやすくなります。他の医師を受診する場合、特に手術や歯の治療を受ける場合には、このお薬を飲んでいることを医師にお話しください。

病院名・薬局名(連絡先)



辰巳化学株式会社