


# エフィナコナゾール爪外用液「トーワ」を使用される方へ

この薬は爪白癬(爪水虫)の原因である真菌(水虫菌)を殺菌します。

爪白癬は治療に時間がかかります。

薬をきちんと塗って水虫菌を殺菌し、新しいきれいな爪に生えかわるのを待ちます。変色した爪や分厚くなった爪を元に戻すわけではありません。

## ● 治療により新しい爪に生え変わるまでのイメージ



爪が生えかわるには半年～1年ほどかかることがあります。

治ったようにみえても、水虫菌が生き残っていることがあります。

医師から指示があるまで、治療を続けてください。

自己判断でやめてしまうと、再発・悪化するおそれがあります。

## 特に注意いただきたいこと

- ✖ 目には使用しないでください。
- ✖ 火気を避けて使用・保存してください。

## 気を付けていただきたいこと

- 医師から指示された爪のみに使用してください。
- 目に入らないよう注意し、万一薬液が目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。異常を感じる場合には眼科医の診察を受けてください。
- 家族を含め他の人と共用しないでください。
- 治療中の爪に化粧品等を使用しないでください。
- 開封後12週間経過した薬液を使わないでください。

裏面もお読みください

## 使用方法


入浴後等は水気をふきとってから使用してください。

必要に応じてやすりや爪切り等で薬を塗る爪のお手入れをしてください。


十分な効果を発揮するために、**毎日塗り続けることが大切です。**

### ①容器を傾け、薬液を先端にしみこませる。

- 薬液が出過ぎがあるので、容器の側面を強く押さえたり、容器全体をにぎったりしないでください。
- キャップを開けた際に薬液がしみ出てきた場合は、おさまるのを待って使用してください。



### ②1日1回、爪全体や爪と皮膚の境目に薬液を塗る。



- 容器を傾けて指先でつまむように持ち、速やかに塗ってください。側面を強く押さないでください。
- 先端を爪に強く押し付けすぎないでください。先端が変形して塗りにくくなる可能性があります。

- 刺激を感じがあるので、皮膚についた薬液はティッシュペーパーや綿棒等でふきとってください。薬を塗る爪の周辺に傷がある場合は特に注意してください。
- 薬を塗った爪は、周囲に触れる前に乾かしてください。

### ③使用後はキャップをしっかりとしめ、**立てて保存する。**

- 高温、直射日光や火気を避け、室温で保存してください。
- 容器の外側についた薬液は、着色があるのでふき取ってください。(容器外側に着色しても、薬はそのままお使いいただけます。)

