

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領2018（2019年更新版）に準拠して作成

抗てんかん剤
ラコサミド錠

**ラコサミド錠50mg「ダイト」
ラコサミド錠100mg「ダイト」**

Lacosamide Tablets

ラコサミドドライシロップ

ラコサミドドライシロップ10%「ダイト」

Lacosamide Dry Syrup 10%

剤形	錠 50mg : フィルムコーティング錠 錠 100mg : フィルムコーティング錠 DS 10% : ドライシロップ
製剤の規制区分	劇薬 処方箋医薬品（医師等の処方箋により使用すること）
規格・含量	ラコサミド錠 50mg 「ダイト」: 1錠中、ラコサミド 50mg 含有する ラコサミド錠 100mg 「ダイト」: 1錠中、ラコサミド 100mg 含有する ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」: 1g 中、ラコサミド 100mg 含有する
一般名	和名：ラコサミド 洋名：Lacosamide
製造販売承認年月日 薬価基準収載・販売開始年月日	製造販売承認年月日：2025年8月15日 薬価基準収載年月日：2025年12月5日 販売開始年月日：2025年12月5日
製造販売（輸入）・提携・販売会社名	販売元：株式会社フェルゼンファーマ 製造販売元：ダイト株式会社
医薬情報担当者の連絡先	
問い合わせ窓口	株式会社フェルゼンファーマ 安全管理部 TEL: 03-6368-5160 FAX: 03-3580-1522 医療関係者向けホームページ https://www.feldsenfpharma.co.jp

本IFは2025年12月改訂の電子添文の記載に基づき作成した。

最新の情報は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

医薬品インタビューフォーム利用の手引きの概要 ー日本病院薬剤師会ー

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

医療用医薬品の基本的な要約情報として、医療用医薬品添付文書（以下、添付文書）がある。医療現場で医師・薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を裏付ける更に詳細な情報が必要な場合があり、製薬企業の医薬情報担当者（以下、MR）等への情報の追加請求や質疑により情報を補完してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための項目リストとして医薬品インタビューフォーム（以下、IFと略す）が誕生した。

1988年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬）学術第2小委員会がIFの位置付け、IF記載様式、IF記載要領を策定し、その後1998年に日病薬学術第3小委員会が、2008年、2013年に日病薬医薬情報委員会がIF記載要領の改訂を行ってきた。

IF記載要領2008以降、IFはPDF等の電子的データとして提供することが原則となった。これにより、添付文書の主要な改訂があった場合に改訂の根拠データを追加したIFが速やかに提供されることとなった。最新版のIFは、医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA）の医療用医薬品情報検索のページ（<http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>）にて公開されている。日病薬では、2009年より新医薬品のIFの情報を検討する組織として「インタビューフォーム検討会」を設置し、個々のIFが添付文書を補完する適正使用情報として適切か審査・検討している。

2019年の添付文書記載要領の変更に合わせ、IF記載要領2018が公表され、今般「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関連する情報整備のため、その更新版を策定した。

2. IFとは

IFは「添付文書等の情報を補完し、医師・薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

IFに記載する項目配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠し、一部の例外を除き承認の範囲内の情報が記載される。ただし、製薬企業の機密等に関わるもの及び利用者自らが評価・判断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、利用者自らが評価・判断・臨床適用するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。

IFの提供は電子データを基本とし、製薬企業での製本は必須ではない。

3. IFの利用にあたって

電子媒体のIFは、PMDAの医療用医薬品情報検索のページに掲載場所が設定されている。

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従ってIFを作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより利用者自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、IFが改訂されるまでの間は、製薬企業が提供する改訂内容を明らかにした文書等、あるいは各種の医薬品情報提供サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、最新の添付文書をPMDAの医薬品医療機器情

報検索のページで確認する必要がある。

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「V.5. 臨床成績」や「XII. 参考資料」、「XIII. 備考」に関する項目等は承認を受けていない情報が含まれることがあり、その取り扱いには十分留意すべきである。

4. 利用に際しての留意点

I Fを日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用していただきたい。I Fは日病薬の要請を受けて、当該医薬品の製造販売又は販売に携わる企業が作成・提供する、医薬品適正使用のための学術資料であるとの位置づけだが、記載・表現には薬機法の広告規則や医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン、製薬協コード・オブ・プラクティス等の制約を一定程度受けざるを得ない。販売情報提供活動ガイドラインでは、未承認薬や承認外の用法等に関する情報提供について、製薬企業が医療従事者からの求めに応じて行うことは差し支えないとされており、MR等へのインタビューや自らの文献調査などにより、利用者自らがI Fの内容を充実させるべきものであることを認識しておかなければならぬ。製薬企業から得られる情報の科学的根拠を確認し、その客観性を見抜き、医療現場における適正使用を確保することは薬剤師の本務であり、I Fを活用して日常業務を更に価値あるものにしていただきたい。

(2020年4月改訂)

目 次

I. 概要に関する項目	
1. 開発の経緯	1
2. 製品の治療学的特性	1
3. 製品の製剤学的特性	1
4. 適正使用に関して周知すべき特性	2
5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項	2
(1)承認条件	2
(2)流通・使用上の制限事項	2
6. RMPの概要	2
II. 名称に関する項目	
1. 販売名	3
(1)和名	3
(2)洋名	3
(3)名称の由来	3
2. 一般名	3
(1)和名（命名法）	3
(2)洋名（命名法）	3
(3)ステム（stem）	3
3. 構造式又は示性式	3
4. 分子式及び分子量	3
5. 化学名（命名法）又は本質	4
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	4
III. 有効成分に関する項目	
1. 物理化学的性質	5
(1)外観・性状	5
(2)溶解性	5
(3)吸湿性	5
(4)融点（分解点）、沸点、凝固点	5
(5)酸塩基解離定数	5
(6)分配係数	5
(7)その他の主な示性値	5
2. 有効成分の各種条件下における安定性	5
3. 有効成分の確認試験法、定量法	5
IV. 製剤に関する項目	
1. 剤形	6
(1)剤形の區別	6
(2)製剤の外観及び性状	6
(3)識別コード	6
(4)製剤の物性	6
(5)その他	7
2. 製剤の組成	7
(1)有効成分（活性成分）の含量及び添加剤	7
(2)電解質等の濃度	7
(3)熱量	7
3. 添付溶解液の組成及び容量	7
4. 力価	7
5. 混入する可能性のある夾雑物	7
6. 製剤の各種条件下における安定性	8
7. 調製法及び溶解後の安定性	12
8. 他剤との配合変化（物理化学的変化）	13
9. 溶出性	13
10. 容器・包装	15
(1)注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報	15
(2)包装	15
(3)予備容量	16
(4)容器の材質	16
11. 別途提供される資材類	16
12. その他	16
V. 治療に関する項目	
1. 効能又は効果	17
2. 効能又は効果に関連する注意	17
3. 用法及び用量	17
(1)用法及び用量の解説	17
(2)用法及び用量の設定経緯・根拠	18
4. 用法及び用量に関連する注意	18
5. 臨床成績	18
(1)臨床データパッケージ	18
(2)臨床薬理試験	18
(3)用量反応探索試験	18
(4)検証的試験	19
1)有効性検証試験	19
2)安全性試験	21
(5)患者・病態別試験	22
(6)治療の使用	22
1)使用成績調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容	22
2)承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要	22
(7)その他	22
VI. 薬効薬理に関する項目	
1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群	23
2. 薬理作用	23
(1)作用部位・作用機序	23
(2)薬効を裏付ける試験成績	23
(3)作用発現時間・持続時間	23
VII. 薬物動態に関する項目	
1. 血中濃度の推移	24
(1)治療上有効な血中濃度	24
(2)臨床試験で確認された血中濃度	24
(3)中毒域	27
(4)食事・併用薬の影響	27
2. 薬物速度論的パラメータ	28
(1)解析方法	28
(2)吸収速度定数	29
(3)消失速度定数	29
(4)クリアランス	29

(5) 分布容積	29	IX. 非臨床試験に関する項目	39
(6) その他	29	1. 薬理試験	39
3. 母集団(ポピュレーション)解析	29	(1) 薬効薬理試験	39
(1) 解析方法	28	(2) 安全性薬理試験	39
(2) パラメータ変動要因	29	(3) その他の薬理試験	39
4. 吸収	29	2. 毒性試験	39
5. 分布	29	(1) 単回投与毒性試験	39
(1) 血液一脳関門通過性	29	(2) 反復投与毒性試験	39
(2) 血液一胎盤関門通過性	29	(3) 遺伝毒性試験	39
(3) 乳汁への移行性	30	(4) がん原性試験	39
(4) 髄液への移行性	30	(5) 生殖発生毒性試験	39
(5) その他の組織への移行性	30	(6) 局所刺激性試験	39
(6) 血漿蛋白結合率	30	(7) その他の特殊毒性	39
6. 代謝	30		
(1) 代謝部位及び代謝経路	30		
(2) 代謝に関与する酵素(CYP等)の分子種、 寄与率	30		
(3) 初回通過効果の有無及びその割合	30		
(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率	30		
7. 排泄	30		
8. トランスポーターに関する情報	31		
9. 透析等による除去率	31		
10. 特定の背景を有する患者	31		
11. その他	33		
VIII. 安全性(使用上の注意等)に関する項目			
1. 警告内容とその理由	34	1. 規制区分	40
2. 禁忌内容とその理由	34	2. 有効期間	40
3. 効能又は効果に関する注意とその理由	34	3. 包装状態での貯法	40
4. 用法及び用量に関する注意とその理由	34	4. 取扱い上の注意	40
5. 重要な基本的注意とその理由	34	5. 患者向け資材	40
6. 特定の背景を有する患者に関する注意	35	6. 同一成分・同効薬	40
(1) 合併症・既往歴等のある患者	35	7. 國際誕生年月日	40
(2) 腎機能障害患者	35	8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準 収載年月日、販売開始年月日	41
(3) 肝機能障害患者	35	9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等 の年月日及びその内容	41
(4) 生殖能を有する者	35	10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその 内容	41
(5) 妊婦	35	11. 再審査期間	41
(6) 授乳婦	35	12. 投薬期間制限に関する情報	41
(7) 小児等	35	13. 各種コード	41
(8) 高齢者	36	14. 保険給付上の注意	41
7. 相互作用	36		
(1) 併用禁忌とその理由	36		
(2) 併用注意とその理由	36		
8. 副作用	36		
(1) 重大な副作用と初期症状	36		
(2) 他の副作用	37		
9. 臨床検査結果に及ぼす影響	37		
10. 過量投与	37		
11. 適用上の注意	38		
12. 他の注意	38		
(1) 臨床使用に基づく情報	38		
(2) 非臨床試験に基づく情報	38		
XI. 文献			
1. 引用文献	42		
2. 他の参考文献	43		
XII. 参考資料			
1. 主な外国での発売状況	44		
2. 海外における臨床支援情報	44		
XIII. 備考			
1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたって の参考情報	45		
(1) 粉碎	45		
(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性	46		
2. 他の関連資料	46		

略語表

略語	略語内容

斜体表記は遺伝子表記であることを示す。

I. 概要に関する項目

1. 開発の経緯

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」及びラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」は、後発医薬品としてダイト株式会社が開発を企画し、「医薬品の承認申請について（平成 26 年 11 月 21 日薬食 1121 第 2 号）」に基づき、規格及び試験方法を設定、加速試験、生物学的同等性試験を実施し、2025 年 8 月に効能又は効果を「てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）」として製造販売承認を取得した。その後、2025 年 12 月に「他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法」の効能追加の一部変更承認を取得し、2025 年 12 月に上市した。

なお、ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」及びラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」は、後発医薬品として、共和薬品工業株式会社、ダイト株式会社の 2 社で共同開発を実施し、共同開発グループとして実施したデータを共有し、承認を得た。

2. 製品の治療学的特性

- (1) ラコサミドは電位依存性ナトリウムチャネルの緩徐な不活性化を選択的に促進し、過興奮状態にある神経細胞膜を安定化させることによって抗けいれん作用を示すと考えられている¹⁾。

【「VI-2. 薬理作用」の項参照】

- (2) 重大な副作用として、房室ブロック（1%未満）、徐脈（1%未満）、失神（1%未満）、中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis:TEN）（頻度不明）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（頻度不明）、薬剤性過敏症症候群（頻度不明）、無顆粒球症（頻度不明）が報告されている。

【「VIII-8. 副作用」の項参照】

3. 製品の製剤学的特性

- (1) 錠剤には識別性向上のため、両面に成分名、規格及び屋号を印刷している。

【「IV-1. 剤形」の項参照】

- (2) PTP シート表面には、1 錠単位で成分名、規格、屋号を表記している。

- (3) PTP シート裏面には、1 錠単位で成分名、規格、屋号及び GS1 コードを表記している。

- (4) ドライシロップは、オレンジ風味の香料を使用しており、添加剤のスクロースにより苦みを抑えている。

- (5) 外箱には、切り離し可能な切り取りタグを施している。

4. 適正使用に関して周知すべき特性

適正使用に関する資材、最適使用推進ガイドライン等	有無	タイトル・参照先
RMP	有	(「I-6. RMP の概要」の項参照)
追加のリスク最小化活動として作成されている資材	無	
最適使用推進ガイドライン	無	
保険適用上の留意事項通知	無	

5. 承認条件及び流通・使用上の制限事項

(1) 承認条件

医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。

(2) 流通・使用上の制限事項

該当しない

6. RMPの概要

1.1. 安全性検討事項		
【重要な特定されたリスク】	【重要な潜在的リスク】	【重要な不足情報】
心電図 PR 延長関連事象(房室ブロック、徐脈、失神等) 中毒性表皮壊死融解症 (Toxic Epidermal Necrolysis : TEN)、皮膚粘膜眼症候群 (Stevens-Johnson 症候群) 薬剤性過敏症症候群 無顆粒球症	自殺行動、自殺念慮	なし
1.2. 有効性に関する検討事項		
使用実態下における有効性		
↓上記に基づく安全性監視のための活動		
2. 医薬品安全性監視計画の概要		
通常の医薬品安全性監視活動 追加の医薬品安全性監視活動 特定使用成績調査(強直間代発作) [小児]		
3. 有効性に関する調査・試験の計画の概要		
なし		
4. リスク最小化計画の概要		
通常のリスク最小化活動 追加のリスク最小化活動 なし		

※最新の情報は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の医薬品情報検索ページで確認してください。

II. 名称に関する項目

1. 販売名

(1) 和名

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」
ラコサミド錠 100mg 「ダイト」
ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

(2) 洋名

Lacosamide Tablets 50mg "DAITO"
Lacosamide Tablets 100mg "DAITO"
Lacosamide Dry Syrup 10% "DAITO"

(3) 名称の由来

「有効成分名」 + 「剤形」 + 「含量」 + 「屋号」より命名した。

2. 一般名

(1) 和名（命名法）

ラコサミド (JAN)


(2) 洋名（命名法）

Lacosamide (JAN)、lacosamide (INN)

(3) ステム (stem)

不明

3. 構造式又は示性式



4. 分子式及び分子量

分子式 : C₁₃H₁₈N₂O₃

分子量 : 250.29

5. 化学名（命名法）又は本質

(2*R*)-2-Acetamido-*N*-benzyl-3-methoxypropanamide (IUPAC)

6. 慣用名、別名、略号、記号番号

CAS 登録番号 : 175481-36-4

III. 有効成分に関する項目

1. 物理化学的性質

(1) 外観・性状

白色～淡黄色の粉末である。

(2) 溶解性

溶媒	日局表現
メタノール	溶けやすい
エタノール (99.5)	やや溶けやすい
水	やや溶けにくい
ヘプタン	ほとんど溶けない

(3) 吸湿性

該当資料なし

(4) 融点（分解点）、沸点、凝固点

該当資料なし

(5) 酸塩基解離定数

該当資料なし

(6) 分配係数

該当資料なし

(7) その他の主な示性値

該当資料なし

2. 有効成分の各種条件下における安定性

該当資料なし

3. 有効成分の確認試験法、定量法

確認試験法

- (1) 紫外可視吸光度測定法
- (2) 赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）

定量法

液体クロマトグラフィー

IV. 製剤に関する項目

1. 剤形

(1) 剤形の区别



ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

錠剤 (フィルムコーティング錠)

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

ドライシロップ剤

(2) 製剤の外観及び性状

販売名	ラコサミド錠 50mg 「ダイト」	ラコサミド錠 100mg 「ダイト」
色・剤型	ピンク色の楕円形の フィルムコーティング錠	濃黄色の楕円形の割線入り フィルムコーティング錠
外 形	表 	
	裏 	
	側面 	
大きさ	長径：約 10.4mm 短径：約 4.9mm 厚さ：約 3.1mm 質量：約 130.6mg	長径：約 13.1mm 短径：約 6.1mm 厚さ：約 4.1mm 質量：約 259.6mg

販売名	ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」
性 状	白色～微黄白色の顆粒

(3) 識別コード

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

錠剤本体に表示

【「IV-1. (2) 製剤の外観及び性状」の項参照】

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

該当しない

(4) 製剤の物性

該当資料なし

(5) その他

該当しない

2. 製剤の組成

(1) 有効成分（活性成分）の含量及び添加剤

販売名	ラコサミド錠 50mg 「ダイト」	ラコサミド錠 100mg 「ダイト」
有効成分	1錠中 ラコサミド 50mg	1錠中 ラコサミド 100mg
添加剤	結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、クロスボビドン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、マクロゴール 4000、タルク、青色二号アルミニウムレーキ、三二酸化鉄、黒酸化鉄、カルナウバロウ	結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、クロスボビドン、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、酸化チタン、マクロゴール 4000、タルク、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウ

販売名	ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」
有効成分	1g 中 ラコサミド 100mg
添加剤	D-マンニトール、クロスボビドン、スクラロース、ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、香料

(2) 電解質等の濃度

該当しない

(3) 熱量

該当資料なし

3. 添付溶解液の組成及び容量

該当しない

4. 力価

該当しない

5. 混入する可能性のある夾雑物

該当資料なし

6. 製剤の各種条件下における安定性

(1) 加速試験²⁾

1) ラコサミド錠 50mg 「ダイト」

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：40°C±2°C、75%±5%RH、3 ロット (n=3)

試験項目	開始時	6 カ月
性状	ピンク色の楕円形の フィルムコーティング錠	同左
確認試験	適合	同左
製剤均一性 含量均一性	適合	同左
溶出性 溶出率 (%) : 15 分 85%以上	92~101	94~101
定量法 含量 (%) : 95.0~105.0%	100.7~102.6	99.7~101.2
純度試験 類縁物質 (参考試験)	規格内	同左
水分 (%) (参考試験)	2.2~2.4	3.6~4.1

2) ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

包装形態：PTP 包装した製品

試験条件：40°C±2°C、75%±5%RH、3 ロット (n=3)

試験項目	開始時	6 カ月
性状	濃黄色の楕円形の割線入り フィルムコーティング錠	同左
確認試験	適合	同左
製剤均一性 含量均一性	適合	同左
溶出性 溶出率 (%) : 15 分 85%以上	92~99	92~100
定量法 含量 (%) : 95.0~105.0%	99.9~101.6	99.0~100.9
純度試験 類縁物質 (参考試験)	規格内	同左
水分 (%) (参考試験)	1.9~2.2	4.1~4.6

3) ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

包装形態：バラ包装品

試験条件：40°C ± 2°C、75% ± 5% RH、3 ロット (n=3)

試験項目	開始時	6 カ月
性状	白色の顆粒	同左
確認試験	適合	同左
溶出性 溶出率 (%) : 15 分 85%以上	100~102	100~101
定量法 含量 (%) : 95.0~105.0%	100.3~101.2	99.7~100.3
純度試験 類縁物質 (参考試験)	規格内	同左
水分 (%) (参考試験)	0.3~0.4	0.3~0.4

(2) PTP 包装状態の安定性 ³⁾

1) ラコサミド錠 50mg 「ダイト」

試験条件：湿度：25°C ± 2°C、75% ± 5% RH

光：D65 のランプ 1000lx/hr、25°C

試験項目	開始時	湿度	光
		90 日	120 万 lx · hr
性状	ピンク色の楕円形のフィルムコーティング錠	同左	同左
溶出性 ^{*1} 溶出率 (%) : 15 分 85%以上	96.7	96.3	97.4
定量法 ^{*2} 含量 (%) : 95.0~105.0%	101.4	100.5	100.8
純度試験 類縁物質	規格内	同左	同左
水分 (%) : 4.7%以下	2.3	3.7	3.4
硬度 ^{*3} : 20N 以上	113	96	103

*1 : 6 ベッセルの平均値

*2 : 3 回の平均値

*3 : 10 錠の平均値

2) ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

試験条件：湿度：25°C ± 2°C、75% ± 5% RH

光：D65 ランプ 1000lx/hr、25°C

試験項目	開始時	湿度	光
		90 日	120 万 lx · hr
性状	濃黄色の楕円形の割線入りフィルムコーティング錠	同左	同左
溶出性 ^{*1} 溶出率 (%) : 15 分 85%以上	95.8	96.1	94.4

定量法 ^{*2} 含量(%) : 95.0~105.0%	100.3	99.4	99.4
純度試験 類縁物質(参考試験)	規格内	同左	同左
水分(%) (参考試験)	2.0	3.2	3.0
硬度 ^{*3} : 20N以上	154	137	142

*1: 6 ベッセルの平均値 *2: 3 回の平均値 *3: 10 錠の平均値

(3) 無包装状態の安定性⁴⁾

1) ラコサミド錠 50mg 「ダイト」

試験条件: 温度: 40°C ± 2°C、遮光、気密容器

湿度: 25°C ± 2°C、75% ± 5%RH、遮光、開放

光: D65 ランプ 1000lx/hr、25°C ± 2°C、60% ± 5%RH

試験項目	開始時	温度	湿度	光
		90 日	90 日	120 万 lx · hr
性状	ピンク色の楕円形 のフィルムコーテ ィング錠	変化なし	変化なし	変化なし
溶出率(%) *1	適合	適合	適合	適合
規格: 15 分 85%以上	96.7	97.8	97.4	95.4
含量(%) *2	規格内	変化なし	変化なし	変化なし
規格: 95.0~105.0%	101.4	101.0	100.6	100.9
純度試験 類縁物質 (参考試験)	規格内	同左	同左	同左
水分(%) : 4.7%以下	2.3	2.4	4.7	4.3
硬度 ^{*3}	規格内	変化なし	変化あり* (規格内)	変化なし
規格(参考値) 20N以上	113	113	69	88

*1: 6 ベッセルの平均値 *2: 3 回の平均値 *3: 10 錠の平均値

※: 113N (開始時) → 69N (規格内、1カ月) → 69N (規格内、3カ月)

「(社)日本病院薬剤師会: 錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成11年8月20日」を参考に評価した。

2) ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

試験条件：温度：40°C、遮光、気密容器

湿度：25°C±2°C、75%±5%RH、遮光、開放

光：D65 ランプ 1000lx/hr、25°C±2°C、60%±5%RH

試験項目	開始時	温度	湿度	光
		90 日	90 日	120 万 lx・hr
性状	濃黄色の楕円形の割線入りフィルムコーティング錠	変化なし	変化なし	変化なし
溶出率 (%) *1	適合	適合	適合	適合
規格：15 分 85%以上	95.8	96.2	96.4	96.4
含量 (%) *2	規格内	変化なし	変化なし	変化なし
規格：95.0～105.0%	100.3	99.5	99.0	99.2
純度試験 類縁物質 (参考試験)	規格内	同左	同左	同左
水分 (%) : 4.7%以下	2.0	2.4	4.7	4.4
硬度*3	規格内	変化なし	変化あり* (規格内)	変化なし
規格 (参考値) 20N 以上	154	149	89	113

*1 : 6 ベッセルの平均値 *2 : 3 回の平均値 *3 : 10 錠の平均値

※ : 154N (開始時) → 85N (規格内、1 カ月) → 89N (規格内、3 カ月)

「(社)日本病院薬剤師会：錠剤・カプセル剤の無包装状態での安定性試験法について(答申)、平成 11 年 8 月 20 日」を参考に評価した。

3) ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

試験条件：温度：40°C±2°C、遮光、気密容器

湿度：25°C±2°C、75%±5%RH、遮光、開放

光：D65 ランプ 1000lx/hr、25°C±2°C、60%±5%RH、シャーレ

試験項目	開始時	温度	湿度	光
		90 日	90 日	120 万 lx・hr
性状	白色の顆粒	変化なし	変化なし	変化なし
溶出率 (%) *	適合	適合	適合	適合
規格：15 分 85%以上	101.2	101.2	100.6	101.6
含量 (%) *2	規格内	変化なし	変化なし	変化なし
規格：95.0～105.0%	100.9	100.8	99.5	100.0
純度試験 類縁物質 (参考試験)	規格内	同左	同左	同左
水分 (%) (参考試験)	0.4	0.2	0.3	0.4

*1 : 6 ベッセルの平均値 *2 : 3 回の平均値

【評価基準】

分類	外観	含量	硬度	崩壊性 溶出性 類縁物質
変化なし	外観上の変化を、ほとんど認めない場合	含量低下が 3%未満の場合	硬度変化が 30%未満の場合	規格値内の場合
変化あり (規格内)	わずかな色調変化(退色等)等を認めるが、品質上、問題とならない程度の変化であり、規格を満たしている場合	含量低下が 3%以上で、規格値内の場合	硬度変化が 30%以上で、硬度が 2.0kgf (20N) 以上の場合	
変化あり (規格外)	形状変化や著しい色調変化等を認め、規格を逸脱している場合	規格値外の場合	硬度変化が 30%以上で、硬度が 2.0kgf (20N) 未満の場合	規格値外の場合

(4) ラコサミド錠 100mg 「ダイト」二分割後の安定性⁵⁾

試験条件：湿度：25°C±2°C、75%±5%RH、遮光、シャーレ開放

光：D65 ランプ 1000lx/hr

試験項目	開始時	湿度	光
		90 日	120 万 lx・hr
性状	濃黄色の楕円形のフィルムコーティング錠の分割品で分割面は白色	同左	同左
製剤均一性 含量均一性	適合	—	—
溶出性 溶出率 (%) : 15 分 85%以上	98~103	99~103	94~101
定量法 含量 (%) : 95.0~105.0%	99.9~100.6	98.9~99.4	99.3~99.7
純度試験 類縁物質 (参考試験)	規格内	同左	同左
水分 (%) (参考試験)	2.0	4.2	3.5

7. 調製法及び溶解後の安定性

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

水道水に溶解後の安定性は、24 時間まで外観に変化はなく、含量は規格値の範囲内であった。

光 (25°C±2°C、1000lx/hr、透明ガラス瓶容器

試験項目	規格値	配合直後	24 時間後
性状	—	わずかに白濁	変化なし
定量法	95.0~105.0%	99.7	99.2

8. 他剤との配合変化（物理化学的変化）

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

該当しない

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」と医薬品との配合変化試験結果を「X III-2. その他の関連資料」に記載


9. 溶出性⁶⁾

(1) ラコサミド錠 50mg 「ダイト」

全ての試験条件において、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン（令和2年3月19日付薬生薬審発0319第1号別紙2）」に示された基準に適合し、ラコサミド錠 50mg 「ダイト」と標準製剤（ラコサミド錠 100mg 「ダイト」）の溶出挙動の類似性が確認された。

各試験液における溶出挙動の同等性の判定

回転数 (回転)	試験液	判定溶出率	判定時点 (分)	平均溶出率 (%)		判定
				試験製剤	標準製剤	
50rpm	pH1.2	85%以上	15	97.7	96.2	適合
	pH4.0	85%以上	15	95.8	96.3	適合
	pH6.8	85%以上	15	96.7	95.1	適合
	水	85%以上	15	97.9	97.1	適合




(2) ラコサミド錠 100mg「ダイト」

全ての試験条件において、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（令和2年3月19日付薬生薬審発0319第1号別紙1）」に示された基準に適合し、ラコサミド錠 100mg「ダイト」と標準製剤（ビムパット錠 100mg）の溶出挙動の類似性が確認された。

各試験液における溶出挙動の同等性の判定

回転数 (回転)	試験液	判定溶出率	判定時点 (分)	平均溶出率 (%)		判定
				試験製剤	標準製剤	
50rpm	pH1.2	85%以上	15	96.2	96.9	適合
	pH4.0	85%以上	15	96.3	97.1	適合
	pH6.8	85%以上	15	95.1	94.0	適合
	水	85%以上	15	97.1	96.2	適合




(3) ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

全ての試験条件において、「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン（令和2年3月19日付薬生薬審発0319第1号別紙1）」に示された基準に適合し、ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」と標準製剤（ビムパットドライシロップ 10%）の溶出挙動の類似性が確認された。

各試験液における溶出挙動の同等性の判定

回転数 (回転)	試験液	判定溶出率	判定時点 (分)	平均溶出率 (%)		判定
				試験製剤	標準製剤	
50rpm	pH1.2	85%以上	15	101.2	99.8	適合
	pH4.0	85%以上	15	101.5	99.6	適合
	pH6.8	85%以上	15	101.4	99.5	適合
	水	85%以上	15	99.8	99.2	適合



10. 容器・包装

(1) 注意が必要な容器・包装、外観が特殊な容器・包装に関する情報

該当しない

(2) 包装

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

PTP : 100錠 [10錠×10]

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

バラ : 100 g [瓶、乾燥剤入り]

(3) 予備容量

該当しない

(4) 容器の材質

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

PTP 包装：ポリプロピレンフィルム、アルミニウム箔

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

バラ包装：ポリエチレン瓶、乾燥剤（シリカゲル）を付与したポリプロピレンキャップ

11. 別途提供される資材類

該当しない

12. その他

該当しない

V. 治療に関する項目

1. 効能又は効果

- てんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）
- 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法

2. 効能又は効果に関連する注意

設定されていない

3. 用法及び用量

(1) 用法及び用量の解説

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

成人：通常、成人にはラコサミドとして 1 日 100mg より投与を開始し、その後 1 週間以上の間隔をあけて增量し、維持用量を 1 日 200mg とするが、いずれも 1 日 2 回に分けて経口投与する。なお、症状により 1 日 400mg を超えない範囲で適宜増減するが、增量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 100mg 以下ずつ行うこと。

小児：通常、4 歳以上的小児にはラコサミドとして 1 日 2mg/kg より投与を開始し、その後 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 2mg/kg ずつ增量し、維持用量を体重 30kg 未満の小児には 1 日 6mg/kg、体重 30kg 以上 50kg 未満の小児には 1 日 4mg/kg とする。いずれも 1 日 2 回に分けて経口投与する。なお、症状により体重 30kg 未満の小児には 1 日 12mg/kg、体重 30kg 以上 50kg 未満の小児には 1 日 8mg/kg を超えない範囲で適宜増減するが、增量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 2mg/kg 以下ずつ行うこと。ただし、体重 50kg 以上的小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

成人：通常、成人にはラコサミドとして 1 日 100mg（ドライシロップとして 1g）より投与を開始し、その後 1 週間以上の間隔をあけて增量し、維持用量を 1 日 200mg（ドライシロップとして 2g）とするが、いずれも 1 日 2 回に分けて用時懸濁して経口投与する。なお、症状により 1 日 400mg（ドライシロップとして 4g）を超えない範囲で適宜増減するが、增量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 100mg（ドライシロップとして 1g）以下ずつ行うこと。

小児：通常、4 歳以上的小児にはラコサミドとして 1 日 2mg/kg（ドライシロップとして 20mg/kg）より投与を開始し、その後 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 2mg/kg（ドライシロップとして 20mg/kg）ずつ增量し、維持用量を体重 30kg 未満の小児には 1 日 6mg/kg（ドライシロップとして 60mg/kg）、体重 30kg 以上 50kg 未満の小児には 1 日 4mg/kg（ドライシロップとして 40mg/kg）とする。いずれも 1 日 2 回に分けて用時懸濁して経口投与する。なお、症状により体重 30kg 未満の小児には 1 日 12mg/kg（ドライシロップとして 120mg/kg）、体重 30kg 以上 50kg 未満の小児には 1 日 8mg/kg（ドライシロップとして 80mg/kg）を超えない範囲で適宜増減するが、增量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日用量として 100mg（ドライシロップとして 200mg）以下ずつ行うこと。

間隔をあけて 1 日用量として 2mg/kg（ドライシロップとして 20mg/kg）以下ずつ行うこと。ただし、体重 50kg 以上のお子様では、成人と同じ用法・用量を用いること。

(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

該当資料なし

4. 用法及び用量に関する注意

7. 用法・用量に関する注意

〈効能共通〉

7.1 クレアチニンクリアランスが 30mL/min 以下の重度及び末期腎機能障害のある患者には、成人は 1 日最高用量を 300mg、お子様は 1 日最高用量を 25% 減量とするなど慎重に投与すること。また、血液透析を受けている患者では、1 日用量に加えて、血液透析後に最大で 1 回用量の半量の追加投与を考慮すること。[9.2.1、9.2.2、16.1.2、16.6.1、16.6.2 参照]

7.2 軽度又は中等度の肝機能障害のある患者（Child-Pugh 分類 A 及び B）には、成人は 1 日最高用量を 300mg、お子様は 1 日最高用量を 25% 減量とするなど慎重に投与すること。[9.3.2、16.6.3 参照]

7.3 本剤の 1 日最高用量は体重 30kg 未満のお子様では 1 日 12mg/kg、体重 30kg 以上 50kg 未満のお子様では 1 日 8mg/kg である。本剤を 1 日 8mg/kg を超えて投与している体重 30kg 未満のお子様が、成長に伴い安定的に体重が 30kg 以上となった場合には、患者の状態を十分に観察し、効果及び副作用の発現を考慮したうえで、適切な用量を検討すること。なお、急激な減量は避けること。

〈強直間代発作〉

7.4 本剤を強直間代発作に対して使用する場合には、他の抗てんかん薬と併用すること。[臨床試験において、強直間代発作に対する本剤単独投与での使用経験はない。]

5. 臨床成績

(1) 臨床データパッケージ

該当しない

(2) 臨床薬理試験

心電図に対する影響

健康成人 214 例にラコサミド 400mg/日、800mg/日^{注6)} 又はプラセボを 1 日 2 回に分けて 6 日間反復経口投与、又はモキシフロキサン 400mg/日を 1 日 1 回 3 日間反復経口投与したとき、ラコサミドは QTc 間隔を延長しなかった。ラコサミド群の PR 間隔の平均変化量は第 6 日目の投与 1 時間後に最大となり、プラセボ群との差は、400mg/日で 7.3ms、800mg/日^{注7)} で 11.9ms であった⁷⁾（外国人データ）。

注) 本剤の承認された 1 日最高用量は 400mg である。

(3) 用量反応探索試験

該当資料なし

(4) 検証的試験

1) 有効性検証試験

〈部分発作（二次性全般化発作を含む）〉

①国際共同第Ⅲ相試験（単剤療法、成人）

新規に又は最近てんかんと診断された部分発作（二次性全般化発作を含む）又は未分類の全般性強直間代発作を有する 16 歳以上の患者を対象として、ラコサミド錠 200～600mg/日^{注1)} 又はカルバマゼピン徐放錠（CBZ-CR）400～1200mg/日^{注2)} を単剤にて経口投与したとき、主要評価項目である Kaplan-Meier 法により推定した最終評価用量における 6 カ月間発作消失率は下表のとおりであり、群間差の 95%信頼区間の下限値は予め設定された非劣性限界値（-12%）を上回ったこと、CBZ-CR 群の 6 カ月間発作消失率に対する群間差の 95%信頼区間の下限値の比（相対差）は、予め設定した非劣性限界値（-20%）を上回ったことから、CBZ-CR に対するラコサミド錠の非劣性が確認された⁸⁾。

解析対象集団	投与群	例数	発作が消失した患者数（割合（%））	発作消失率（%）[95%信頼区間] ^{a)}	群間差（%）[95%信頼区間] ^{a,b)}	相対差（%） ^{c)}
FAS ^{d)}	ラコサミド錠群	444 ^{f)}	327 (73.6)	89.8 [86.8, 92.8]	-1.3 [-5.5, 2.8]	-6.0
	CBZ-CR 群	442 ^{g)}	308 (69.7)	91.1 [88.2, 94.0]		
PPS ^{e)}	ラコサミド錠群	408	307 (75.2)	91.5 [88.6, 94.3]	-1.3 [-5.3, 2.7]	-5.7
	CBZ-CR 群	397	285 (71.8)	92.8 [90.0, 95.5]		

a) Kaplan-Meier 法による推定値（過去 3 カ月間の発作回数（2 回以下、3 回以上）を層として Mantel-Haenszel 法により調整）

b) ラコサミド錠群の消失率-CBZ-CR 群の消失率

c) 消失率の群間差の 95%信頼区間の下限値/CBZ-CR 群の消失率 × 100

d) Full Analysis Set

e) Per Protocol Set

f) 日本人症例 7 例を含む

g) 日本人症例 13 例を含む

なお、事後解析結果によるラコサミド錠群で 400mg/日超への增量が必要となった患者を効果不十分例として扱った場合の FAS における発作が消失した患者数（割合（%））は 308^{注3)}/444 例（69.4%）であり、Kaplan-Meier 法により推定した発作消失率 [95%信頼区間] は 84.1% [80.5, 87.6] であった。

副作用発現頻度は、ラコサミド錠群で 37.2%（165/444 例）であった。主な副作用は、浮動性めまい 7.9%（35/444 例）、疲労 5.6%（25/444 例）、傾眠 4.5%（20/444 例）であった。

注 1) 本剤の承認された 1 日最高用量は 400mg である。

注 2) カルバマゼピン徐放錠は本邦では承認されていない。

注 3) 200～400mg/日投与で発作が消失した患者数。

②国内第Ⅲ相試験（単剤療法、成人）

1 剤の既存の抗てんかん薬を投与している 16 歳以上の部分発作を有するてんかん患者を対象として、ラコサミド錠 200～600mg/日^{注4)} 経口投与による単剤療法へ切り替えたとき、6 カ月間発作消失患者の割合は 46.2%（6/13 例）であった⁹⁾。

副作用発現頻度は、84.2%（16/19 例）であった。主な副作用は、浮動性めまい 42.1%（8/19 例）、傾眠 31.6%（6/19 例）、回転性めまい、恶心が各 10.5%（2/19 例）であった。

注) 本剤の承認された 1 日最高用量は 400mg である。

③国際共同第Ⅲ相試験（併用療法、成人）

既存の抗てんかん薬で十分な発作抑制効果が得られない部分発作を有する 16 歳以上の日本人及び中国人のてんかん患者 547 例（日本人患者 142 例を含む）を対象として、ラコサミド錠 200、400mg/日又はプラセボを 16 週間経口投与（既存の抗てんかん薬 1～3 剤との併用）したとき、主要評価項目である観察期間に対する維持期間の 28 日あたりの部分発作回数変化量は下表のとおりであり、プラセボ群とラコサミド錠 200mg/日及び 400mg/日群との間で統計学的に有意な差が認められた。なお、各群における 50%レスポンダーレート（28 日あたりの部分発作回数が観察期間と比べて 50%以上改善した患者の割合）は、プラセボ群 19.7%（36/183 例）、ラコサミド錠 200mg/日群 38.5%（70/182 例）及びラコサミド錠 400mg/日群 49.2%（88/179 例）であった¹⁰⁾。

	例数 ^{a)}	28 日あたりの部分発作回数の変化量 ^{b)}	p 値 ^{c)}	プラセボ群に対する減少率 ^{d)} [95%信頼区間]
プラセボ群	183	-1.22		
200mg/日群	182	-3.33	<0.001	29.4 [18.7, 38.7]
400mg/日群	179	-4.50	<0.001	39.6 [30.5, 47.6]

a) Full Analysis Set

b) 中央値

c) 対数変換した維持期間の 28 日あたりの部分発作回数を反応変数、投与群及び国を因子、対数変換した観察期間の 28 日あたりの部分発作回数を共変量とする共分散分析

d) 共分散分析より推定された最小二乗平均値から計算した部分発作回数減少率 (%)

副作用発現頻度は、ラコサミド錠群で 47.7%（173/363 例）であった。主な副作用は、浮動性めまい 22.9%（83/363 例）、傾眠 8.8%（32/363 例）、複視 4.4%（16/363 例）であった。

④海外第Ⅲ相試験（小児）

既存の抗てんかん薬で十分な発作抑制効果が得られない部分発作を有する 4 歳以上 17 歳未満の小児てんかん患者 343 例を対象として、ラコサミド（体重 30kg 未満の患者は 8～12mg/kg/日、体重 30～50kg 未満の患者は 6～8mg/kg/日、体重 50kg 以上の患者は 300～400mg/日）又はプラセボを 16 週間経口投与（既存の抗てんかん薬 1～3 剤との併用）したとき、主要評価項目である観察期間に対する維持期間の 28 日あたりの部分発作回数変化量は下表のとおりであり、プラセボ群とラコサミド群との間で統計学的に有意な差が認められた¹¹⁾。

	例数 ^{a)}	28 日あたりの部分発作回数の変化量 ^{b)}	p 値 ^{c)}	プラセボ群に対する減少率 ^{d)} [95%信頼区間]
プラセボ群	170	-1.55		
ラコサミド群	170	-3.05	0.0003	31.72 [16.342, 44.277]

a) Full Analysis Set

プラセボ群の 2 例は、維持期間の発作回数データに欠測（発作日誌の項目の 10%超）があったため、解析に含めなかった

b) 中央値

c) $\ln(X+1)$ （X は部分発作回数）で対数変換した部分発作回数を用い、投与群、併合した実施医療機関を因子とし、対数変換した観察期間の 28 日あたりの部分発作回数を共変量とした共分散分析

d) プラセボ群に対する減少率 (%) = $100 \times \{1 - \exp(-\text{最小二乗平均のラコサミド群とプラセボ群の差})\}$

副作用発現頻度は、ラコサミド群で 33.9%（58/171 例）であった。主な副作用は、傾眠 14.0%

(24/171 例)、浮動性めまい 8.8% (15/171 例) であった。

〈強直間代発作〉

⑤国際共同第Ⅲ相試験（成人及び小児）

既存の抗てんかん薬で十分な発作抑制効果が得られない強直間代発作を有する 4 歳以上のてんかん患者 242 例（日本人患者 30 例を含む）を対象として、ラコサミド（体重 30kg 未満の小児患者は 8～12mg/kg/日、体重 30～50kg 未満の小児患者は 6～8mg/kg/日、体重 50kg 以上の中児及び成人患者は 300～400mg/日）又はプラセボを最長で 24 週間経口投与（既存の抗てんかん薬 1～3 剤との併用）したとき、主要評価項目である 24 週間の治療期間における 2 回目の強直間代発作が発現するまでの時間は下表のとおりであり、プラセボとラコサミド群との間で統計学的に有意な差が認められた¹²⁾。

投与群	例数 ^{a)}	イベント発現までの日数(日) ^{b)} [95%信頼区間]	ハザード比 ^{c)} [95%信頼区間]	p 値 ^{c)}
プラセボ群	121	77.0 [49.0, 128.0]	0.540 [0.377, 0.774]	<0.001
ラコサミド群	118	— [144.0, —]		

a) Full Analysis Set

ラコサミド群の 1 例は 125 件のイベントが発現した後に無作為化割付けされたため、2 例は 24 週間の治療期間の発作情報が得られなかつたため、解析に含めなかつた

b) Kaplan-Meier 法による 24 週間の治療期間における 2 回目の強直間代発作の発現までの時間の推定値（中央値）

「—」：ラコサミド群では 24 週間の治療期間に 2 回目の強直間代発作が 50% 以上の症例に認められなかつたため推定不能

c) 観察期間における 28 日あたりの強直間代発作の回数が 2 回以下の小児、2 回以下の成人、2 回超の小児又は成人を層とした Cox 比例ハザードモデルに基づく。Wald 法により算出された

副作用発現頻度は、ラコサミド群で 46.3% (56/121 例) であった。主な副作用は、浮動性めまい 17.4% (21/121 例)、傾眠 13.2% (16/121 例)、悪心 7.4% (9/121 例) であった。

2) 安全性試験

〈部分発作（二次性全般化発作を含む）〉

①国際共同長期継続投与試験（成人）

国際共同第Ⅲ相試験（併用療法）を完了した日本及び中国の患者 473 例（日本人患者 123 例を含む）を対象として、ラコサミド錠 100～400mg/日を 1 日 2 回に分けて経口投与したとき（中間報告、最長 767 日投与）、先行試験の観察期間からの 28 日あたりの部分発作回数減少率の中央値は 55.23%、50% レスポンダーレートは 56.3% (265/471 例) であった¹³⁾。

副作用発現頻度は、ラコサミド錠群で 42.9% (203/473 例) であった。主な副作用は、浮動性めまい 17.8% (84/473 例)、傾眠 5.7% (27/473 例)、頭痛 3.8% (18/473 例) であった。

②国際共同第Ⅱ相長期継続投与試験（小児）

4 歳から 17 歳の直接登録された小児てんかん患者 136 例（日本人 46 例、外国人 90 例）を対象として、ラコサミド 12mg/kg/日（体重 50kg 以上の患者は 600mg/日^{注)}）までを 1 日 2 回に分けて経口投与したとき、観察期間からの全治療期間における部分発作回数変化率の中央値は -52.73%（日本人で -27.63%、外国人で -60.56%）であった¹⁴⁾。

副作用発現頻度は、56.2% (77/137 例) であった。主な副作用は、浮動性めまい 20.4% (28/137

例)、傾眠 19.7% (27/137 例)、振戦 8.0% (11/137 例) であった。

注) 本剤の承認された 1 日最高用量は、成人及び体重 50kg 以上の中には 400mg、体重 30 以上 50kg 未満の中には 8mg/kg、体重 30kg 未満の中には 12mg/kg である。

〈強直間代発作〉

③国際共同長期継続投与試験（成人及び小児）

国際共同第Ⅲ相試験（成人及び小児）を完了した患者及び当該試験での適格性基準のうち強直間代発作回数の基準のみを満たさなかった患者 239 例（日本人患者 37 例を含む）を対象として、ラコサミド（体重 50kg 未満の中には 4～12mg/kg/日、体重 50kg 以上の中には 200～600mg/日、成人患者は 200～800mg/日^{注)}）を 1 日 2 回に分けて経口投与したとき（中間報告、最長 1416 日投与）、先行試験の観察期間からの治療期間における 28 日あたりの強直間代発作回数変化率の中央値は-88.52% であった¹⁵⁾。

副作用発現頻度は、34.7% (83/239 例) であった。主な副作用は、浮動性めまい 10.9% (26/239 例)、傾眠 5.9% (14/239 例)、回転性めまい及び恶心 3.8% (9/239 例) であった。

注) 本剤の承認された 1 日最高用量は、成人及び体重 50kg 以上の中には 400mg、体重 30 以上 50kg 未満の中には 8mg/kg、体重 30kg 未満の中には 12mg/kg である。

(5) 患者・病態別試験

該当資料なし

(6) 治療的使用

1) 使用成績調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容

該当資料なし

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要

該当しない

(7) その他

該当資料なし

VI. 薬効薬理に関する項目

1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群

レベチラセタム、ラモトリギン、トピラマート、ガバペンチン、クロバザム、ゾニサミド、フェニトイント、バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン

注意：関連のある化合物の效能・効果等は、最新の電子添文を参照すること。

2. 薬理作用

(1) 作用部位・作用機序

ラコサミドは電位依存性ナトリウムチャネルの緩徐な不活性化を選択的に促進し、過興奮状態にある神経細胞膜を安定化させることによって抗けいれん作用を示すと考えられている¹⁾。

(2) 薬効を裏付ける試験成績

1) てんかん発作に対する作用

ラコサミドは聴原性発作マウス、扁桃核キンドリング発作マウス、海馬キンドリング発作ラット、6Hz てんかん発作マウス及び最大電気ショック発作（マウス、ラット）の部分発作及び全般発作を反映した動物モデルにおいて発作を抑制した¹⁶⁾。

2) 抗てんかん原性作用

扁桃核電気刺激キンドリングラットにおいて、キンドリング形成を抑制した¹⁷⁾。

(3) 作用発現時間・持続時間

該当資料なし

VII. 薬物動態に関する項目

1. 血中濃度の推移

(1) 治療上有効な血中濃度

該当資料なし

(2) 臨床試験で確認された血中濃度

1) 単回投与（成人）

健康成人男性 18 例にラコサミド 100、200、400mg を空腹時に単回経口投与したとき、投与後 0.5～4 時間で Cmax に達し、 $t_{1/2}$ は約 14 時間であった。AUC 及び Cmax は投与量に比例して増加した¹⁸⁾。

単回投与時の薬物動態パラメータ

投与量	100mg	200mg	400mg
例数	12	11	12
AUC _{0-∞} ($\mu\text{ g} \cdot \text{h/mL}$)	57.0 [20.4]	116.4 [18.2]	219.1 [16.1]
AUC _{0-t} ($\mu\text{ g} \cdot \text{h/mL}$)	55.0 [18.7]	112.1 [17.1]	212.5 [15.0]
Cmax ($\mu\text{ g/mL}$)	2.96 [15.2]	5.84 [25.0]	11.8 [15.4]
$t_{\text{max}} (\text{h})$	1.00 (0.50–4.00)	1.00 (0.25–1.50)	1.00 (0.50–4.00)
$t_{1/2} (\text{h})$	14.0 [20.2]	14.6 [13.0]	13.7 [15.3]
CL/F (L/h)	1.75 [20.4]	1.72 [18.2]	1.83 [16.1]
Vd/F (L)	35.5 [13.4]	36.3 [13.0]	36.2 [12.8]

幾何平均値 [CV (%)]、 t_{max} は中央値（範囲）

2) 反復投与（成人）

健康成人男性 5 例にラコサミド 200mg/回を 1 日 2 回 7 日間反復経口投与したとき、血漿中ラコサミド濃度は投与開始から 3 日後に定常状態に到達した。AUC_{0-12h} の累積係数は 2.4 であった¹⁹⁾（外国人データ）。

3) 小児

非盲検 3 試験及び二重盲検 1 試験において 6 カ月^{注1)}から 17 歳までの小児てんかん患者 414 例（日本人 46 例を含む）から得られた血漿中ラコサミド濃度を用いて母集団薬物動態解析を行い、小児におけるラコサミドの薬物動態パラメータを推定した。本解析におけるラコサミドの投与量は 2～12mg/kg/日を 1 日 2 回投与（体重 50kg 以上の小児での最高用量は 600mg/日^{注2)}）であった。見かけの分布容積（Vd/F）は 0.71L/kg、見かけの全身クリアランス（CL/F）は体重及び年齢に依存し、体重 15kg の 4 歳児で 0.88L/h (0.058L/h/kg)、体重 25kg の 8 歳児で 1.18L/h (0.047L/h/kg)、体重 40kg の 12 歳児で 1.60L/h (0.040L/h/kg)、体重 50kg の 16 歳児で 1.83L/h (0.037L/h/kg) と推定された²⁰⁾。

注 1) 本剤は 4 歳以上の小児に対して適用を有している。

注 2) 本剤の承認された 1 日最高用量は、成人及び体重 50kg 以上の中には 400mg、体重 30kg 以上 50kg 未満の中には 8mg/kg、体重 30kg 未満の中には 12mg/kg である。

4) 生物学的同等性

健康成人男性 24 例にラコサミド 100mg(ドライシロップ 10% を 1g 又は 100mg 錠を 1 錠)を空腹時単回投与したとき、ラコサミドの薬物動態パラメータは以下のとおりであった。ドライシロップ 10% と 100mg 錠の生物学的同等性が確認された²¹⁾。

単回投与時の薬物動態パラメータ

薬物動態パラメータ	ドライシロップ 10% (例数=24)	100mg 錠 (例数=24)	幾何平均の比 ^{a)} (90%信頼区間)
Cmax (μ g/mL)	4.46 [23.5]	4.24 [29.5]	1.05 (0.93–1.19)
AUC _{0-t} (μ g · h/mL)	56.2 [14.7]	56.0 [15.7]	1.00 (0.99–1.02)
t _{max} (h)	0.25 (0.25–0.75)	0.50 (0.25–3.00)	—

Cmax 及び AUC_{0-t} は幾何平均値 [CV (%)]

t_{max} は中央値 (範囲)

a) ドライシロップ/錠

5) 生物学的同等性試験²²⁾

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」は、「含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン」に基づき、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」を標準製剤としたとき、溶出挙動が同等と判断され、生物学的に同等とみなされた。

【「IV-9. 溶出性」の項参照】


ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

(後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(令和 2 年 3 月 19 日付薬生薬審発 0319 第 1 号 別紙 1)に準拠し実施)

ラコサミド錠 100mg 「ダイト」とビムパット錠 100mg を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1 錠 (ラコサミドとして 100mg) 健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90% 信頼区間法にて統計解析を行った結果、log (0.80) ~ log (1.25) の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$)	Cmax($\mu\text{g}/\text{mL}$)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ラコサミド錠 100mg 「ダイト」	49.20±6.41	4.44±1.11	0.55±0.41	11.84±1.28
ビムパット錠 100mg	48.31±6.75	4.42±1.57	0.47±0.18	12.04±1.31

(Mean±S.D., n=19)



	AUC ₀₋₇₂	Cmax
2 製剤間の対数変換値の差	log (1.02)	log (1.02)
90%信頼区間	log (1.00) ~ log (1.04)	log (0.88) ~ log (1.18)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。


ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

(後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン(令和2年3月19日付薬生薬審発0319第1号別紙1)に準拠し実施)

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」とビムパットドライシロップ 10%を、クロスオーバー法によりそれぞれ 1g (ラコサミドとして 100mg) 健康成人男性に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定し、得られた薬物動態パラメータ (AUC、Cmax) について 90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、 $\log (0.80) \sim \log (1.25)$ の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。

	判定パラメータ		参考パラメータ	
	AUC ₀₋₇₂ ($\mu\text{g}\cdot\text{hr}/\text{mL}$)	Cmax($\mu\text{g}/\text{mL}$)	Tmax (hr)	t _{1/2} (hr)
ラコサミドドライシロップ 10%「ダイト」	53.19±4.88	4.06±0.98	0.45±0.21	12.65±1.33
ビムパットドライシロップ 10%	53.11±5.17	4.19±0.93	0.44±0.43	12.74±1.35

(Mean±S.D., n=18)



	AUC ₀₋₇₂	Cmax
2 製剤間の対数変換値の差	log (1.00)	log (0.97)
90%信頼区間	log (0.98) ~ log (1.03)	log (0.88) ~ log (1.06)

血漿中濃度並びに AUC、Cmax 等のパラメータは、被験者の選択、体液の採取回数・時間等の試験条件によって異なる可能性がある。

(3) 中毒域

該当資料なし

(4) 食事・併用薬の影響

1) 食事の影響

健康成人男性 24 例にラコサミド 300mg を空腹時又は食後に単回経口投与したとき、食事はラコサミドの AUC_{0-t} 及び Cmax に影響を及ぼさなかった²³⁾ (外国人データ)。

2) 併用薬の影響

①カルバマゼピン

健康成人男性 19 例に、ラコサミド (200mg/回、1 日 2 回) の定常状態において、強い CYP3A 誘導薬及び中程度の CYP2C9 誘導薬であるカルバマゼピン (200mg/回、1 日 2 回) を併用反復経口投与したとき、カルバマゼピンはラコサミドの定常状態の AUC_{0-12h} 及び C_{max} に影響を及ぼさなかった。健康成人男性 18 例に、カルバマゼピン (200mg/回、1 日 2 回) の定常状態において、ラコサミド (200mg/回、1 日 2 回) を併用反復経口投与したとき、ラコサミドはカルバマゼピンの定常状態の AUC_{0-12h} 及び C_{max} に影響を及ぼさなかった²⁴⁾ (外国人データ)。

②オメプラゾール

健康成人男性 34 例に、ラコサミド (300mg) の単回経口投与において、弱い CYP2C19 阻害薬であるオメプラゾール (40mg/回、1 日 1 回) を併用反復経口投与したとき、オメプラゾールはラコサミドの AUC_{0-t} 及び C_{max} に影響を及ぼさなかった。

CYP2C19 基質であるオメプラゾール (40mg) の単回経口投与において、ラコサミド (300mg/回、1 日 2 回) を併用反復経口投与したとき、ラコサミドはオメプラゾールの AUC_{0-t} 及び C_{max} に影響を及ぼさなかった²⁵⁾ (外国人データ)。

③ミダゾラム

健康成人男性 33 例に、CYP3A 基質であるミダゾラム (7.5mg) の単回経口投与において、ラコサミド (200mg/回、1 日 2 回) を併用反復経口投与したとき、ラコサミドはミダゾラムの C_{max} を 30% 増加させたが AUC_{0-t} に影響を及ぼさなかった²⁶⁾ (外国人データ)

④ワルファリン

健康成人男性 16 例に、S-ワルファリンが CYP2C9 基質であるワルファリン (25mg) の単回経口投与において、ラコサミド (200mg/回、1 日 2 回) を併用反復経口投与したとき、ラコサミドは S 及び R-ワルファリンの AUC_{0-t} 及び C_{max} に影響を及ぼさず、プロトロンビン時間及びプロトロンビン時間の国際標準比 (INR) の最大値及び AUC_{0-168h} に影響を及ぼさなかった²⁷⁾ (外国人データ)。

3) 母集団薬物動態解析

日本人及び外国人の成人及び小児のてんかん患者から得られた血漿中ラコサミド濃度データを用いて、母集団薬物動態解析を行った。その結果、CYP 誘導作用を有する抗てんかん薬であるカルバマゼピン、フェニトイン又はフェノバルビタールの併用により、ラコサミドの定常状態の AUC は、成人及び小児で、各々 25% 及び 17% 減少した^{20),28)}。

2. 薬物速度論的パラメータ

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) 吸収速度定数

該当資料なし

(3) 消失速度定数

該当資料なし

(4) クリアランス

健康成人にラコサミド 200mg を 30 分間で単回点滴静脈内投与したとき、全身クリアランス (CL) は 1.78L/h であり、ラコサミド 200mg を単回経口投与したとき、見かけの全身クリアランス (CL/F) は 1.84L/h であった²⁹⁾。

(5) 分布容積

健康成人 24 例にラコサミド 200mg を 30 分間で単回点滴静脈内投与したとき、分布容積 (Vd) は 31.1L であり、ラコサミド 200mg を単回経口投与したとき、見かけの分布容積 (Vd/F) は 32.8L であった。

(6) その他

該当資料なし

3. 母集団（ポピュレーション）解析

(1) 解析方法

該当資料なし

(2) パラメータ変動要因

該当資料なし

4. 吸収

健康成人 24 例にラコサミド 200mg を 30 及び 60 分間で単回点滴静脈内投与又は単回経口投与したとき、ラコサミドの AUC_{0-t} 及び Cmax は同程度であり、ラコサミド錠の絶対バイオアベイラビリティはほぼ 100% であった²⁹⁾。

5. 分布

(1) 血液-脳関門通過性

該当資料なし

(2) 血液-胎盤関門通過性

該当資料なし

<参考>

ラットにおいて胎児移行性が認められている。

【「VIII-6. (5) 妊婦」の項参照】

(3) 乳汁への移行性

ヒト乳汁中へ移行することが報告されている。

【「VIII-6. (6) 授乳婦」の項参照】

(4) 髄液への移行性

該当資料なし

(5) その他の組織への移行性

該当資料なし

(6) 血漿蛋白結合率

in vitro (ラコサミド 1.5~60 μg/mL) 及び *ex vivo* (ラコサミド 0.7~5.5 μg/mL) 試験の結果、ラコサミドの血漿蛋白結合率は 15%未満であった^{29),30)}。

6. 代謝

(1) 代謝部位及び代謝経路

ラコサミドは腎排泄及び代謝により体内から消失した。

(2) 代謝に関与する酵素 (CYP 等) の分子種、寄与率

in vitro 試験の結果、薬理学的に不活性な主代謝物である O-脱メチル体生成に主に寄与する CYP 分子種は、CYP3A4、CYP2C9 及び CYP2C19 であった^{31),32)}。

ラコサミドは、治療血漿中濃度域で CYP1A2、2B6、2C9、2C19 及び 3A4 に対して誘導作用を示さず、CYP1A1、1A2、2A6、2B6、2C8、2C9、2D6、2E1、3A4 及び 3A5 に対して阻害作用を示さなかったが、CYP2C19 に対する阻害作用が示唆された。

ラコサミドは、P-糖蛋白質の典型的な基質ではなく、P-糖蛋白質に対して阻害作用を示さなかった³³⁾ (*in vitro*)。

(3) 初回通過効果の有無及びその割合

該当資料なし

(4) 代謝物の活性の有無及び活性比、存在比率

該当資料なし

7. 排泄

健康成人男性各 5 例に [¹⁴C] -ラコサミド 100mg (40μCi) を単回経口投与及び 1 時間で単回点滴静脈内投与したとき、投与後 168 時間までに、尿中に投与量の 94%及び 97%が排泄され、糞中の排泄は 0.5%未満であった。尿中へはラコサミド (約 30~40%)、O-脱メチル体 (約 30%)、極性画分 (約 20%) 及び他の微量な代謝物 (0.5~2%) として排泄された^{31),34)} (外国人データ)。

健康成人男性にラコサミド 100~400mg を単回経口投与したとき、投与 72 時間後までの尿中排泄率は、ラコサミド 29~33%、O-脱メチル体 10~15%であった。血漿中 O-脱メチル体の AUC_{0-t}

は血漿中ラコサミドの約 10%であった¹⁸⁾。

8. トランスポーターに関する情報

該当資料なし

9. 透析等による除去率

該当資料なし

【「VII-10. (2) 血液透析を受けている末期腎機能障害患者」の項参照】

10. 特定の背景を有する患者

(1) 腎機能障害患者

腎機能の程度の異なる成人被験者にラコサミド 100mg を単回経口投与したとき、AUC_{0-t} は腎機能正常者 (CL_{CR} : ≥80mL/min) と比較して、軽度低下者 (CL_{CR} : 50～<80mL/min) では 27%、中等度低下者 (CL_{CR} : 30～<50mL/min) で 22%、重度低下者 (CL_{CR} : <30mL/min) で 59% 高く、C_{max} は軽度から重度の腎機能低下者で 10～14% 高かった。軽度から重度の腎機能低下者における O-脱メチル体の AUC_{0-t} は腎機能正常者の 1.5～4.6 倍であった³⁵⁾ (外国人データ)。

単回投与時の薬物動態パラメータ

腎機能	正常	軽度低下	中等度低下	重度低下
例数	8	8	8	8
CL _{CR} (mL/min)	≥80	50～<80	30～<50	<30
AUC _{0-t} (μg · h/mL)	47.0 [20.8]	59.6 [17.5]	57.6 [19.0]	74.8 [26.9]
C _{max} (μg/mL)	2.69 [35.0]	2.95 [20.7]	3.06 [10.0]	3.02 [23.3]
t _{max} (h)	1.0 (0.5～2.0)	0.5 (0.5～1.0)	0.5 (0.5～1.0)	1.0 (0.5～1.5)
t _{1/2} (h)	13.2 [17.6]	18.2 [18.7]	15.4 [18.9]	18.3 [27.8]
CL/F (L/h)	2.13 [20.8]	1.68 [17.5]	1.74 [19.0]	1.34 [26.9]
CL _R (L/h)	0.590 [37.9]	0.354 [51.3]	0.277 ^{a)} [24.4]	0.143 [31.8]

幾何平均値 [CV (%)]、AUC_{0-t} は 0～96 時間値、t_{max} は中央値 (範囲)、CL_R : 腎クリアランス
a) 7 例

【「VIII-6. (2) 腎機能障害患者」の項参照】

(2) 血液透析を受けている末期腎機能障害患者

血液透析を受けている末期腎機能障害の成人被験者に、非透析時及び透析開始 2.5 時間前にラコサミド 100mg を単回経口投与したとき、非透析時に比べ 4 時間の透析実施時ではラコサミドの AUC_{0-t} は 46% 減少し、透析による除去効率はラコサミド 57%、O-脱メチル体 53% であり、透析クリアランスはラコサミド 140mL/min (8.40L/h)、O-脱メチル体 149mL/min (8.94L/h) であった^{35),36)} (外国人データ)

単回投与時の薬物動態パラメータ

血液透析	非透析時	4 時間透析時
例数	8	8
ラコサミド		
AUC _{0-t} (μg · h/mL)	43.2 [20.2]	23.2 [15.1]
Cmax(μg/mL)	3.18 [22.4]	2.79 [22.1]
t _{max} (h)	0.50 (0.5–4.0)	0.75 (0.5–2.0)
t _{1/2} (h)	19.6 [19.4]	19.2 [26.8]
O-脱メチル体		
AUC _{0-t} (μg · h/mL)	6.63 [74.3]	3.43 [68.5]
Cmax(μg/mL)	0.48 [69.5]	0.22 [69.1]

幾何平均値 [CV (%)]、AUC_{0-t}は0~24 時間値、t_{max}は中央値（範囲）

【「VIII-6. (2)腎機能障害患者」の項参照】

(3) 肝機能障害患者

肝機能が中等度に低下した成人 (Child-Pugh 分類 B) にラコサミド 100mg/回を 1 日 2 回 5 日間反復経口投与したとき、健康成人に比べてラコサミドの定常状態の AUC_{0-12h} 及び Cmax はそれぞれ 61%及び 50%高かった。また、体重で基準化した定常状態の AUC_{0-12h} 及び Cmax はそれぞれ 47%及び 37%高かった。重度肝機能障害患者 (Child-Pugh 分類 C) での薬物動態は検討していない³⁷⁾ (外国人データ)

定常状態の薬物動態パラメータ

肝機能	正常	Child-Pugh 分類 B
例数	8	8
AUC _{0-12h} (μg · h/mL)	53.3 [17.3]	85.9 [21.7]
Cmax(μg/mL)	5.83 [13.3]	8.75 [18.7]
t _{max} (h)	1.5 (0.5–2.0)	1.5 (0.5–2.0)
t _{1/2} (h)	14.8 [19.7]	24.1 [23.5]

幾何平均値 [CV (%)]、t_{max}は中央値（範囲）

【「VIII-6. (3)肝機能障害患者」の項参照】

(3) 高齢者

65 歳以上の高齢男性 11 例及び高齢女性 12 例にラコサミド 100mg/回を 1 日 2 回 5 日間反復経口投与したとき、45 歳以下の成人男性 12 例と比較して、高齢男性及び女性においてラコサミドの定常状態の AUC_{0-12h} はそれぞれ 33%及び 50%高く、Cmax はそれぞれ 29%及び 53%高かった。また、体重で基準化した AUC_{0-12h} は高齢男性及び女性においてそれぞれ 26%及び 23%高かった^{38,39)} (外国人データ)。

【「VIII-6. (8)高齢者」の項参照】

(4) CYP2C19 遺伝子多型

日本人及び中国人健康成人男性各 18 例を、CYP2C19 遺伝子型に基づく代謝能分類により、急速代謝能者（UM）1 例、高代謝能者（EM）17 例、中間代謝能者（IM）10 例、及び低代謝能者（PM）8 例に分け、この集団にラコサミド 100～400mg を単回経口投与したとき、ラコサミドの投与量及び体重で基準化した $AUC_{0-\infty}$ は、EM に比べて PM で 24%、IM で 10% 高かった¹⁸⁾。

11. その他

該当資料なし

VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目

1. 警告内容とその理由

設定されていない

2. 禁忌内容とその理由

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

2.1 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

2.2 重度の肝機能障害のある患者 [9.3.1、16.6.3 参照]

3. 効能又は効果に関連する注意とその理由

設定されていない

4. 用法及び用量に関連する注意とその理由

「V-4. 用法及び用量に関連する注意」参照

5. 重要な基本的注意とその理由

8. 重要な基本的注意

8.1 連用中における投与量の急激な減量ないし投与中止により、てんかん発作の増悪又はてんかん重積状態があらわれることがあるので、投与を中止する場合には、少なくとも1週間以上かけて徐々に減量するなど慎重に行うこと。

8.2 浮動性めまい、霧視、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので、本剤投与中の患者には自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。

8.3 PR 間隔の延長があらわれがあるので、本剤の投与中は第二度以上の房室ブロック等に関連する症状（頻脈、脈拍数減少、脈拍不整、頭部ふらふら感、失神、動悸、息切れ等）の発現に注意すること。本剤の投与中にそのような症状があらわれた場合には、医師の診察を受けるよう患者及びその家族等に指導すること。心伝導障害や重度の心疾患（心筋梗塞又は心不全等）の既往のある患者、ナトリウムチャネル異常（ブルガダ症候群等）のある患者、PR 間隔の延長を起こすおそれのある薬剤を併用している患者等では、本剤投与開始時及び本剤投与中は心電図検査を行うなど、患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。
[9.1.1、10.2、11.1.1 参照]

8.4 易刺激性、興奮、攻撃性等の精神症状があらわれ、自殺企図に至ることもあるので、本剤投与中は患者の状態及び病態の変化を注意深く観察すること。[8.5、15.1 参照]

8.5 患者及びその家族等に攻撃性、自殺企図等の精神症状発現の可能性について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう指導すること。[8.4、15.1 参照]

8.6 複視、霧視等の眼障害が生じる可能性があるので、診察時に、眼障害について問診を行う等注意し、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。[15.2.1 参照]

6. 特定の背景を有する患者に関する注意

(1) 合併症・既往歴等のある患者

9.1 合併症・既往歴等のある患者

9.1.1 心伝導障害や重度の心疾患（心筋梗塞又は心不全等）の既往のある患者、ナトリウムチヤネル異常（ブルガダ症候群等）のある患者

本剤のPR間隔延長作用により房室ブロック等が発現するおそれがある。[8.3、10.2、11.1.1 参照]

(2) 腎機能障害患者

9.2 腎機能障害患者

9.2.1 重度腎機能障害のある患者

[7.1、16.6.1 参照]

9.2.2 血液透析を受けている末期腎機能障害患者

[7.1、16.6.2 参照]

(3) 肝機能障害患者

9.3 肝機能障害患者

9.3.1 重度の肝機能障害のある患者

投与しないこと。本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。[2.2、16.6.3 参照]

9.3.2 軽度又は中等度の肝機能障害のある患者（Child-Pugh分類A及びB）

[7.2、16.6.3 参照]

(4) 生殖能を有する者

設定されていない

(5) 妊婦

9.5 妊婦

妊娠又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

ラットにおいて胎児移行性が認められている。

(6) 授乳婦

9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

ヒト乳汁中へ移行することが報告されている。

(7) 小児等

9.7 小児等

9.7.1 低出生体重児、新生児、乳児又は4歳未満の幼児に対する臨床試験は実施していない。

9.7.2 小児患者の部分発作に対する単剤療法に関する臨床試験は国内・海外ともに行われていない。

(8) 高齢者

9.8 高齢者

一般に高齢者では生理機能が低下している。[16.6.4 参照]

7. 相互作用

(1) 併用禁忌とその理由

設定されていない

(2) 併用注意とその理由

10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
PR 間隔の延長を起こすおそれのある薬剤 [8.3、9.1.1、11.1.1 参照]	房室ブロック等が発現するおそれがある。	併用により PR 間隔延長作用が相加的に増強するおそれがある。

8. 副作用

11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

(1) 重大な副作用と初期症状

11.1 重大な副作用

11.1.1 房室ブロック、徐脈、失神（いずれも 1%未満）

PR 間隔の延長を起こすおそれがある。[8.3、9.1.1、10.2 参照]

11.1.2 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis: TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）（いずれも頻度不明）

発熱、紅斑、水疱・びらん、そう痒、咽頭痛、眼充血、口内炎等の異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

11.1.3 薬剤性過敏症症候群（頻度不明）

初期症状として発疹、発熱がみられ、更に肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球增多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。なお、ヒトヘルペスウイルス 6 (HHV-6) 等のウイルスの再活性化を伴うことが多く、投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化があるので注意すること⁴⁰⁾。

11.1.4 無顆粒球症（頻度不明）

(2) その他の副作用

11.2 その他の副作用

	3%以上	1~3%未満	1%未満	頻度不明
精神神経系	浮動性めまい (17.8%)、頭痛、傾眠	記憶障害、振戦、運動失調	うつ病、幻覚、攻撃性、激越、感覚鈍麻、錯感覚、認知障害、異常行動、錯乱状態、注意力障害、平衡障害、不眠症、眼振、構語障害、嗜眠、協調運動異常、ミオクローヌス性てんかん	精神病性障害、多幸気分
眼		複視、霧視		
血液		白血球数減少		
消化器	悪心、嘔吐	下痢	消化不良、口内乾燥、鼓腸、便秘	
循環器			心房細動	心房粗動
肝臓		肝機能異常		
代謝及び栄養		食欲減退		
皮膚			発疹、蕁麻疹、そう痒症	血管浮腫
免疫系			薬物過敏症	
筋骨格系			筋痙攣	
感覚器		回転性めまい	耳鳴	
その他	疲労	歩行障害、易刺激性	転倒、挫傷、裂傷、鼻咽頭炎、発熱、無力症、酩酊感	咽頭炎

9. 臨床検査結果に及ぼす影響

設定されていない

10. 過量投与

13. 過量投与

13.1 症状

過量投与（最大 12000mg）により認められた主な症状は、浮動性めまい、悪心、発作（全般性強直間代発作、てんかん重積状態）、心伝導障害、ショック及び昏睡であった。また、ラコサミド 7000mg を一度に服用した例で死亡が報告されている。

13.2 処置

本剤は血液透析により除去可能であり、発現している症状の程度に応じて血液透析の実施を考慮すること。[16.6.2 参照]

11. 適用上の注意

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

14. 適用上の注意

14.1 薬剤交付時の注意

PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」

設定されていない

12. その他の注意

(1) 臨床使用に基づく情報

15.1 臨床使用に基づく情報

海外で実施された複数の抗てんかん薬における、てんかん、精神疾患等を対象とした 199 のプラセボ対照臨床試験の検討結果において、自殺念慮及び自殺企図の発現のリスクが、抗てんかん薬の服用群でプラセボ群と比較して約 2 倍高く（抗てんかん薬服用群：0.43%、プラセボ群：0.24%）、抗てんかん薬の服用群では、プラセボ群と比べ 1000 人あたり 1.9 人多いと計算された（95%信頼区間：0.6–3.9）。また、てんかん患者のサブグループでは、プラセボ群と比べ 1000 人あたり 2.4 人多いと計算されている。[8.4、8.5 参照]

(2) 非臨床試験に基づく情報

15.2 非臨床試験に基づく情報

15.2.1 非臨床薬物動態試験において、ラコサミドはラットの水晶体に投与後 35 日目まで分布したが、ラットの 26 週間及び 104 週間反復投与毒性試験で眼に異常は認められず、イヌの 52 週間反復投与毒性試験において水晶体の変化は認められなかった。複視、霧視等の眼に関する副作用の発現率はプラセボ群より高く、16 週間投与の日中共同第Ⅲ相試験のプラセボ群では 1.6%に対し、本剤 200mg/日群で 4.9%、400mg/日群で 12.2%、長期投与では 5.5%であり、海外第Ⅲ相試験（併合成績）のプラセボ群では 4.4%に対し、本剤 200mg/日群で 8.9%、400mg/日群で 18.0%、600mg/日群で 30.5%であった。[8.6 参照]

15.2.2 欠神発作モデルである WAG/Rij ラット（3、10 及び 30mg/kg を腹腔内投与）及びストラスブル遺伝性欠神てんかんラット（15.6 及び 31.2mg/kg を腹腔内投与）において、欠神発作の増悪が認められた。

IX. 非臨床試験に関する項目

1. 薬理試験

(1) 薬効薬理試験

「VI. 薬効薬理に関する項目」の項参照

(2) 安全性薬理試験

該当資料なし

(3) その他の薬理試験

該当資料なし

2. 毒性試験

(1) 単回投与毒性試験

該当資料なし

(2) 反復投与毒性試験

該当資料なし

(3) 遺伝毒性試験

該当資料なし

(4) がん原性試験

該当資料なし

(5) 生殖発生毒性試験

該当資料なし

【「VIII-6. (5) 妊婦」の項参照】

(6) 局所刺激性試験

該当資料なし

(7) その他の特殊毒性

該当資料なし

X. 管理的事項に関する項目

1. 規制区分

製 剤：ラコサミド錠 50mg 「ダイト」・100mg 「ダイト」・ドライシロップ 10% 「ダイト」
劇薬、処方箋医薬品注)

注) 注意一医師等の処方箋により使用すること

有効成分：ラコサミド 効薬

2. 有効期間

有効期間：3年

3. 包装状態での貯法

貯法：室温保存

4. 取扱い上の注意

設定されていない

5. 患者向け資材

患者向医薬品ガイド：有り

くすりのしおり：有り

その他の患者向け資材：無し

6. 同一成分・同効薬

同一成分薬：

先発医薬品名：ビムパット錠 50mg、ビムパット錠 100mg、ビムパットドライシロップ 10%

同 効 薬：

レベチラセタム、ラモトリギン、トピラマート、ガバペンチン、クロバザム、ゾニサミド、
フェニトイントリウム及びカルバマゼピン

7. 国際誕生年月日

2008年8月29日（欧洲）

8. 製造販売承認年月日及び承認番号、薬価基準収載年月日、販売開始年月日

販売名	製造販売承認年月日	承認番号	薬価基準収載年月日	販売開始年月日
ラコサミド錠 50mg 「ダイト」	2025年8月15日	30700AMX00169000	2025年12月5日	2025年12月5日
ラコサミド錠 100mg 「ダイト」	2025年8月15日	30700AMX00170000	2025年12月5日	2025年12月5日
ラコサミドドライシロップ 10%「ダイト」	2025年8月15日	30700AMX00168000	2025年12月5日	2025年12月5日

9. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容

一部変更承認年月日：2025年12月3日

追加された承認内容

「他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法」の効能又は効果

10. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容

該当しない

11. 再審査期間

該当しない

12. 投薬期間制限に関する情報

本剤は、投薬(あるいは投与)期間に関する制限は定められていない。

13. 各種コード

販売名	厚生労働省薬価基準収載医薬品コード	個別医薬品コード(YJコード)	HOT(9桁)番号	レセプト電算処理システム用コード
ラコサミド錠 50mg 「ダイト」	1139015F1108	1139015F1108	129909001	622990901
ラコサミド錠 100mg 「ダイト」	1139015F2104	1139015F2104	129910601	622991001
ラコサミドドライシロップ 10%「ダイト」	1139015R1090	1139015R1090	129911301	622991101

14. 保険給付上の注意

本剤は診療報酬上の後発医薬品である。

X I . 文献

1. 引用文献

- 1) Errington AC, et al. : Mol Pharmacol. 2008 ; 73 : 157-169
- 2) ダイト株式会社：安定性に関する資料（社内資料）
- 3) ダイト株式会社：PTP 包装状態の安定性に関する資料
- 4) ダイト株式会社：無包装状態での安定性に関する資料（社内資料）
- 5) ダイト株式会社：二分割後の安定性に関する資料（社内資料）
- 6) ダイト株式会社：溶出性に関する資料（社内資料）
- 7) Kropeit D, et al. : Acta Neurol Scand. 2015 ; 132 : 346-354
- 8) 部分発作単剤療法の国際共同実薬対照試験（ビムパット錠：2017年8月25日承認、審査報告書）
- 9) 部分発作併用療法から単剤療法への切り替え試験（ビムパット錠：2017年8月25日承認、審査報告書）
- 10) 日本及び中国における部分発作併用療法のプラセボ対照比較試験（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.7.1）
- 11) 小児患者を対象とした部分発作併用療法のプラセボ対照比較試験（ビムパット錠・ドライシロップ：2019年1月8日承認、申請資料概要 2.7.3.2、2.7.6.3.1）
- 12) 成人及び小児患者を対象とした強直間代発作併用療法の国際共同プラセボ対照試験（ビムパット錠・ドライシロップ：2020年12月25日承認、申請資料概要 2.7.6.1.1）
- 13) 日本及び中国における部分発作併用療法の長期継続投与試験（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.8.1）
- 14) 小児患者を対象とした部分発作併用療法の長期継続投与試験（ビムパット錠・ドライシロップ：2019年1月8日承認、申請資料概要 2.7.6.4.1）
- 15) 成人及び小児患者を対象とした強直間代発作併用療法の長期継続投与試験（ビムパット錠・ドライシロップ：2020年12月25日承認、申請資料概要 2.7.6.2.1）
- 16) 効力を裏付ける試験（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.6.2.2）
- 17) Brandt C, et al. : Epilepsia. 2006 ; 47 : 1803-1809
- 18) 岡垣琢也他：薬理と治療. 2015 ; 43 : 1307-1316
- 19) 外国人健康成人におけるラコサミド反復投与時の薬物動態（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.3.3）
- 20) 日本人及び外国人小児患者における母集団薬物動態解析（ビムパット錠・ドライシロップ：2019年1月8日承認、申請資料概要 2.7.2.2.2、2.7.2.2.3、2.7.2.3）
- 21) 岡垣琢也他：薬理と治療. 2018 ; 46 : 1331-1338
- 22) ダイト株式会社：生物学的同等性試験に関する資料（社内資料）
- 23) 外国人健康成人におけるラコサミドの薬物動態に及ぼす食事の影響（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.1.1）
- 24) Cawello W, et al. : J Clin Pharmacol. 2010 ; 50 : 459-471
- 25) Cawello W, et al. : Clin Drug Investig. 2014 ; 34 : 317-325

- 26) ミダゾラムとの薬物相互作用（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.5.9）
- 27) Stockis A, et al. : Epilepsia. 2013 ; 54 : 1161-1166
- 28) ラコサミドに関する母集団薬物動態解析（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.2.2.5.2）
- 29) 寺田清人他：臨床精神薬理. 2018 ; 21 : 1223-1234
- 30) 血漿たん白結合率（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.2.2.1.1）
- 31) 代謝（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.2.3.3）
- 32) 排泄（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.2.3.4）
- 33) 薬物相互作用試験（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.6.4.5、2.6.4.7）
- 34) Cawello W, et al. : Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2012 ; 37 : 241-248
- 35) Cawello W, et al. : Clin Pharmacokinet. 2013 ; 52 : 897-906
- 36) 腎機能の低下がラコサミド単回経口投与時の薬物動態に及ぼす影響の検討（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.4.4）
- 37) 外国人肝機能低下者における薬物動態（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.4.5）
- 38) Schaefer C, et al. : Clin Drug Investig. 2015 ; 35 : 255-265
- 39) 年齢差及び性差がラコサミド単回及び反復経口投与時の薬物動態に及ぼす影響の検討（ビムパット錠：2016年7月4日承認、申請資料概要 2.7.6.4.1）
- 40) 厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏症症候群

2. その他の参考文献

該当資料なし

X II. 参考資料

1. 主な外国での発売状況

該当しない

2. 海外における臨床支援情報

(1) 妊婦への投与に関する海外情報

該当資料なし

(2) 小児等への投与に関する海外情報

該当資料なし

X III. 備考

1. 調剤・服薬支援に際して臨床判断を行うにあたっての参考情報

本項の情報に関する注意

本項には承認を受けていない品質に関する情報が含まれる。試験方法等が確立していない内容も含まれており、あくまでも記載されている試験方法で得られた結果を事実として提示している。医療従事者が臨床適用を検討する上での参考情報であり、加工等の可否を示すものではない。

掲載根拠：「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて（その3）」令和元年9月6日付 厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課事務連絡

(1) 粉碎

1) ラコサミド錠 50mg 「ダイト」

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」について、粉碎後における各種条件下の安定性を検討した。

試験条件：湿度：25°C±2°C、75%±5%RH

光：1000lx/hr、25°C

試験項目	開始時	湿度	光
		90日	120万lx・hr
性状	ピンク色の皮膜及び白色の粉末	同左	同左
定量法* 含量(%)：95.0～105.0%	101.4	100.5	100.9
純度試験 類縁物質	規格内	同左	同左

* : 3回の平均値

2) ラコサミド錠 100mg 「ダイト」

ラコサミド錠 100mg 「ダイト」について、粉碎後における各種条件下の安定性を検討した。

試験条件：湿度：25°C±2°C、75%±5%RH

光：1000lx/hr、25°C

試験項目	開始時	湿度	光
		90日	120万lx・hr
性状	濃黄色の皮膜及び白色の粉末	同左	同左
定量法* 含量(%)：95.0～105.0%	100.3	99.5	99.6
純度試験 類縁物質	規格内	同左	同左

* : 3回の平均値

(2) 崩壊・懸濁性及び経管投与チューブの通過性

ラコサミド錠 50mg 「ダイト」、ラコサミド錠 100mg 「ダイト」 の錠剤を用いて下記の試験を行った。

1) 崩壊懸濁試験

「内服薬経管投与ハンドブック 第4版」を参考にシリンジのピストン部を抜き取り、シリンジ内に錠剤を1個入れてピストンを戻し、シリンジに55°Cのお湯20mLを吸い取り、筒先に蓋をして5分間自然放置した。5分後にシリンジを手で90度15往復横転し、崩壊懸濁の状況を観察する。5分後に崩壊しない場合は、さらに5分間放置後、同様の操作を行う。それでも崩壊しない場合は、この方法を中止する。中止した製品は、錠剤1個を薬包紙に包み、上から乳棒で数回叩いて破壊後、上述と同様の操作を行う。

2) 通過性試験

得られた懸濁液を経管栄養用カテーテル(8Fr. 120cm)の注入端より、約2~3mL/secの速度で注入し、通過性を観察する。チューブはベッド上の患者を想定し、体内挿入端から3分の2を水平にし、他端(注入端)を30cmの高さにセットする。注入後に適量の水を注入してチューブ内を洗うとき、チューブ内に残存物が見られなければ、通過性に問題なしとする。

3) 試験結果

販売名		結果
ラコサミド錠 50mg 「ダイト」	崩壊懸濁試験	5分間時で完全に崩壊し、良好な懸濁状態を示した。
	通過性試験	チューブサイズ8フレンチを通過した。
ラコサミド錠 100mg 「ダイト」	崩壊懸濁試験	5分間時で完全に崩壊し、良好な懸濁状態を示した。
	通過性試験	チューブサイズ8フレンチを通過した。

2. その他の関連資料

(1) ラコサミドドライシロップ10%「ダイト」の配合試験結果

試験条件：

配合量：ラコサミドドライシロップ10%「ダイト」の常用1回最大使用量である1gと各配合薬剤の常用1回最大使用量に対応する比率で配合した。

保存形態：ポリセロファンラミネートフィルム

保存条件：25±2°C、75±5%RH)に設定した恒温恒湿器内に保存した。

試験時期：配合直後、7日目、14日目、30日目

試験結果：

いずれの検体においても、配合条件下では30日目まで性状及び含量は規格内であった。

分類	薬剤名 (一般名)	配合量	試験 項目	保存期間			
				配合直後	7日間	14日間	30日間
単剤	ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」 (ラコサミド)	1 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.2	99.4	99.6	100.9
抗てんかん薬	デパケン細粒 40% (バルプロ酸ナトリウム)	1.5 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.8	100.0	101.3	101.0
	アレビアチン散 10% (フェニトイイン)	1.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.7	100.4	100.8	101.1
	テグレトール細粒 50% (カルバマゼピン)	1.2 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.4	100.3	100.9	101.0
	カルバマゼピン細粒 50%「アメル」 (カルバマゼピン)	1.2 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.6	100.5	100.7	101.0
	エクセグラント散 20% (ゾニサミド)	2.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.5	102.3	101.2	101.5
	マイスタン細粒 1% (クロバザム)	3.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	101.1	101.7	100.5	103.1
	リボトリール細粒 0.5% (クロナザepam)	1.2 g	外観	うすい橙色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.8	101.2	101.2	101.0
	エピレオブチマル散 50% (エトスクシミド)	1.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.6	101.1	99.6	100.8
	プリミドン細粒 99.5%「日医工」 (プリミドン)	0.754 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.2	101.1	99.5	99.9
抗不安薬	クランポール末 (アセチルフェネトライド)	0.4 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.2	101.2	99.8	100.4
	イーケプラドライシロップ 50% (レベチラセタム)	1.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.3	99.1	101.4	101.1
	フィコンバ細粒 1% (ペランバネル水和物)	1.2 g	外観	黄色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.9	100.6	101.8	101.0
	フェノバール散 10% (フェノバルビタール)	2.0 g	外観	淡紅色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.3	100.0	102.4	101.2
	セルシン散 1% (ジアゼパム)	1.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.9	99.4	101.4	99.5
利尿薬	ダイアモックス末 (アセタゾラミド)	0.75 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.7	101.4	99.5	101.2
抗精神病薬	ニューレブチル細粒 10% (プロペリシアジン)	0.3 g	外観	淡黄色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.0	98.7	100.6	100.2
	エビリファイ散 1% (アリピプラゾール)	2.4 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.0	100.2	102.8	102.6
	アリピプラゾール散 1%「アメル」 (アリピプラゾール)	2.4 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.6	100.2	103.0	102.3
消化性潰瘍治療薬	リスペダール細粒 1% (リスペリドン)	0.3 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.6	101.2	98.9	100.3
整腸剤	マーズレン S 配合顆粒 (アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物・L-グルタミン)	0.667 g	外観	淡青白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	99.6	98.8	100.6	100.7
複合ビタミン剤	ビオフェルミン R 散 (耐性乳酸菌)	1.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	98.9	99.1	100.7	100.9
	シナール配合顆粒 (アスコルビン酸・パントテン酸 カルシウム)	3.0 g	外観	淡黄色	変化なし	変化なし	変化なし
パーキンソン病薬	アマンタジン塩酸塩細粒 10% 「サワイ」 (アマンタジン塩酸塩)	1.0 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	100.3	100.6	101.0	101.2
総合健胃薬	ドバストン散 98.5% (レボドバ)	3.553 g	外観	白色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	101.8	101.2	102.6	102.8
	S・M配合散 (タカヂアスター・生薬配合剤)	1.3 g	外観	淡灰色	変化なし	変化なし	変化なし
			含量(%)	101.2	101.0	100.3	100.5

(2) GS1 コード

販売名	包装単位	GS1 コード	
		調剤包装単位コード	販売包装単位コード
ラコサミド錠 50mg 「ダイト」	PTP100 錠	(01)04987923509802	(01)14987923507805
ラコサミド錠 100mg 「ダイト」	PTP100 錠	(01)04987923509901	(01)14987923507904
ラコサミドドライシロップ 10% 「ダイト」	100g	(01)04987923610003	(01)14987923608014

販売元



株式会社フェルゼンファーマ
札幌市中央区北10条西24丁目3番地

製造販売元

DAITO ダイト株式会社
富山县富山市八日町326番地