

ロスバスタチン錠・OD錠「フェルゼン」を 服用される患者様へ

このお薬について



このお薬は、肝臓でのコレステロール合成を阻害することにより、血液中のコレステロールを低下させます。

このお薬を飲むときに注意すること



筋肉の副作用として、ごくまれに「横紋筋融解症」*が起ることが知られています。

飲み始めてから、次のような症状がみられましたら、横紋筋融解症の可能性があるので、直ちに服用をやめて、すぐに主治医または薬剤師に連絡してください。

- ☐ 筋肉が痛い
- ☐ 手足の力がはいらぬ
- ☐ 尿の色が濃い(赤褐色になる)

- 副作用はどんなお薬にもありますが、早期に発見し、適切な処置をおこなえば、大事に至ることはほとんどありません。
- 薬を服用して他にも体調がおかしいと感じたら、医師または薬剤師に相談してください。
- 医師に指示された用法・用量を守ってください。

裏面もご覧ください。

その他のご注意

- 光の当たらない涼しいところに、湿気を避けて保存してください。
- 誤って飲んでしまわないよう、こどもの手の届かないところに保管してください。

* 横紋筋融解症とは？

筋肉障害により、手足や全身の筋肉痛、しびれや脱力(感)などの症状があらわれ、筋肉の成分(ミオグロビン)が血液中に流れ出る病気です。また、尿の色が濃く、赤褐色の尿がみられることがあります。

これらの症状を放置していると、尿がでにくくなるなど腎臓の機能が低下することがあります。

これらのほかにも、何か分からないことや 気になること などが
ありましたら、医師 または 薬剤師 にご相談ください。



株式会社フェルゼンファーマ
FELDSOLF PHARMA

2024年7月作成
2SAG-1-000