

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

アドレナリン α_2 受容体作動薬
緑内障・高眼圧症治療剤
ブリモニジン酒石酸塩点眼液

処方箋医薬品

ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」

2022年11月



販売元
株式会社フェルゼンファーマ
札幌市中央区北10条西24丁目3番地



製造販売元
ロートニッテン株式会社
名古屋市南区桜本町40番地の2

拝啓

時下、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記のとおり「使用上の注意」を改訂致しましたので、今後のご使用に際しましては、下記の内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

＜改訂内容（2022年11月改訂）＞

「適用上の注意」の項の記載を一部改訂し、以下のように改めました。

(.....: 削除箇所)

改訂後	改訂前
<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤交付時の注意</p> <p>患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。・ 患眼を開瞼して結膜囊内に点眼し、1～5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。・ 他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。	<p>14. 適用上の注意</p> <p>14.1 薬剤交付時の注意</p> <p>患者に対し以下の点に注意するよう指導すること。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 薬液汚染防止のため、点眼のとき、容器の先端が直接目に触れないように注意すること。・ 点眼に際しては、原則として仰臥位をとり、患眼を開瞼して結膜囊内に点眼し、1～5分間閉瞼して涙嚢部を圧迫させた後、開瞼すること。・ 他の点眼剤を併用する場合には、少なくとも5分以上間隔をあけてから点眼すること。

【改訂理由】

先発医薬品と記載を統一するため、自主改訂を行いました。

2019年4月1日から適用されている「医療用医薬品の添付文書等の記載要領」に関連する記載整備であり、特別な注意喚起を要するものではありません。

以上

これらの情報は、DSU（医薬品安全対策情報）への掲載予定はございません。

なお、改訂後の電子化された添付文書につきましては、医薬品医療機器総合機構ホームページ(<https://www.pmda.go.jp>)および弊社ホームページ(<https://www.feldsenpharma.co.jp>)に掲載しますので、併せてご参照ください。